

この説明文書は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

コレステロールが気になる方へ

第3類医薬品

# ヘキシトール

血清高コレステロール改善薬

## 特長

- ヘキシトールは、肝臓でコレステロールの代謝を促進し、余分なコレステロールを体外に排泄を促すパンテチン(スイッチOTC成分)に、コレステロールの吸収を抑える大豆油不けん化物、および血管のサビである過酸化脂質の生成を抑制するビタミンEを配合した血清高コレステロールを改善及び血清高コレステロールに伴う末梢血行障害(手足の冷え・しびれ)を緩和する医薬品です。
- ヘキシトールはのみやすいソフトカプセルです。



## 使用上の注意

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください  
医師の治療を受けている人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、胃部不快感、胸やけ、食欲不振、腹痛、はきけ

(2) 1か月位服用してもコレステロール値の改善が見られない場合  
(1か月ほど服用後、医療機関でコレステロール値の測定をしてください。)

3. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。  
出血が長く続く場合は、医師または薬剤師に相談してください
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください  
下痢、軟便

## 効能・効果

- 血清高コレステロールの改善
- 血清高コレステロールに伴う末梢血行障害(手足の冷え・しびれ)の緩和

## 用法・用量

次の量を食後に水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2カプセル	3回
15才未満	服用しないでください	

### (用法・用量に関連する注意)

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)血清高コレステロールの改善には食事療法が大切なので、本剤を服用しても食事療法を行ってください。

## 成分・分量

成人1日量 6カプセル中

成分	分量	はたらき
パンテチン (80%パンテチン水溶液)	375mg	肝臓におけるコレステロールの代謝を促進させ、血液中の余分なコレステロールを減少させて、血管壁へのコレステロール沈着をおさえる働きがあります。
大豆油不けん化物 (ソイステロール)	600mg	大豆油から生成された成分で、コレステロールの吸収を抑え、体外排泄を促進させます。
酢酸d- $\alpha$ -トコフェロール (天然型ビタミンE)	100mg	抗酸化作用により、動脈硬化などの原因となる過酸化脂質の生成を抑える働きにより、血行を改善させます。

添加物としてポリソルベート80、サフラワー油、カプセルにゼラチン、グリセリン、D-ソルビトール、サンセットイエローFCF、酸化チタンを含んでいます。

## 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

### ●お問い合わせ先●

美吉野製薬株式会社 お客様相談係

TEL (0745)67-0144 受付時間10:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)



発売元

美吉野製薬株式会社

製造販売元

東海カプセル株式会社

奈良県吉野郡大淀町大岩692

静岡県富士市久沢168番地