

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

## 血中の高コレステロール改善に DHC フクイゲン

<血清高コレステロール改善薬>

第3類医薬品

DHCフクイゲンは、3つの有効成分を配合した高コレステロールを改善する治療薬。「パンテチン」は肝臓における悪玉(LDL)コレステロールの分解を促進し、善玉(HDL)コレステロールを増加させ、「大豆油不けん化物」は小腸で余分なコレステロールの吸収を阻害。さらに、「天然型ビタミンE」が血行を促進することで、手足の冷え・しびれを緩和します。



### 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、胃部不快感、胸やけ、食欲不振、腹痛
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢、軟便
- 1ヶ月位服用してもコレステロール値の改善がみられない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1ヶ月ほど服用後、医療機関でコレステロール値の測定をしてください。)

### ■ 効能・効果

- 血清高コレステロールの改善
- 血清高コレステロールに伴う末梢血行障害(手足の冷え・しびれ)の緩和

裏面も必ずお読みください。

## ■ 用法・用量

次の量を1日3回食後に服用してください。

成人(15才以上)・・・1回2カプセル  
15才未満は服用しないこと。

### 【用法・用量に関連する注意】

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 血清高コレステロールの改善には食事療法が大切なので、本剤を服用しても食事療法を行ってください。

## ■ 成分・分量

6カプセル(1日量)中

日本薬局方パンテチン(80%パンテチン水溶液).....	375mg
大豆油不けん化物.....	600mg
酢酸d- $\alpha$ -トコフェロール(天然型ビタミンE).....	100mg

添加物として、ポリソルベート80、サフラワー油、ゼラチン、グリセリン、D-ソルビトール、酸化チタン、黄色5号を含有します。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

医薬品  
相談室

tel. 03-3762-2581

受付時間 9:00~17:00(日・祝日をのぞく)

DHC

製造販売元

株式会社ディー・エイチ・シー

東京都港区南麻布 2-7-1 ☎0120-333-906

DHCホームページ

パソコン <http://www.dhc.co.jp>

携帯 <http://www.dhc.jp>