

この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

第3類医薬品

血中の脂質改善

スリムロール®B


血清高コレステロール改善薬

高くなったコレステロールを正常値にもどしたい方に

スリムロール®Bは、血中の脂質が気になる方や、血中の脂質が多く、血流がスムーズでない方に適しています。

＝スリムロールBの特徴＝

- リボフラビン酪酸エステルは持続性のビタミンB₂で、3つの働きが血中の脂質を改善します。
 - ①血中の脂質が余分に作られないように抑制します。
 - ②余分な血中の脂質の排泄を促進します。
 - ③血中の脂質の代謝を促進します。
- 小さく服用しやすい錠剤です。
- 1日2回で血中の脂質改善を行います。



※血中の脂質とは、コレステロールのことです



ご使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、胸やけ、胃部膨満感、食欲不振

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

下痢

4. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】

血清高コレステロールの改善

【用法・用量】

次の量を食後に服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	2錠	1日2回
15歳未満	服用しないこと	

- 定められた用法、用量を厳守してください。

【成分・分量】

4錠中

成 分	分 量
リボフラビン酪酸エステル (ビタミンB ₂)	60mg

添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、タルク含有

- 本剤の服用に際して、尿が黄色くなるがありますが、これは本剤に含まれるリボフラビン酪酸エステルが吸収され、その一部が尿中に排泄されるためです。
- 本剤に見られるわずかな赤い斑点は、有効成分をそのまま成形したことによるもので、品質には問題ありません。

コレステロールを増やさないために

本来、コレステロールは、体の細胞の構成成分であり、また、胆汁やホルモンの合成に必要な物質です。しかし血液中に余分なコレステロールが増えると、血管の壁に蓄積し、「生活習慣病」の1つである動脈硬化の原因になります。動脈硬化は脳梗塞や心筋梗塞といった致命的な疾患の原因になることがわかっています。

余分なコレステロールを増やさないためには、規則正しい食生活・適度な運動などの毎日の心がけが大切です。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップをきちんと締めて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

製品についてのお問い合わせ

- ・お買い求めの販売店
- ・ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口:076-438-1107
〔受付時間:月～金(祝祭日・年末年始を除く)9:00～17:00〕

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168