

成光片仔膽

第2類
医薬品

成分及び分量 一日量(二包)中

麝香 一、〇厩 添加物 C M C I Ca

牛黄 五〇、〇厩 バレイシヨデンブソ

熊胆 五〇、〇厩 デヒドロ酢酸Na

人參一、二〇〇、〇厩 ヒドロキシプロピルセルロース

用法及び用量

大人 十五才以上 一回……………一包
七才以上十五才未満 一回……………二分の一包

一日二回、食間空腹時に白湯又は清水にて服用する。

(注意)小児に服用させる場合には、保護者の指導

監督のもとに服用させること。

効能又は効果

胃腸虚弱、消化不良、下痢、

動悸、息切れ、気付け、

小児五疳、夜なき、ひきつけ、

意 一、直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。

注 二、小児の手の届かない所に保管すること。

三、服用に際しては、添付文書をよく読むこと。

四、他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

五、配置期限の過ぎた製品は、服用しないこと。

奈良県北葛城郡広陵町大塚七三九

成光薬品工業株式会社

二一包入(二包九〇〇厩)二三、〇〇〇円



改定年月 平成二十二年四月

服用に際して、この文書を必読下さい。
又、必要な時に読めるよう大切に保管
して下さい。

⚠️使用上の注意

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用・事故がおこりやすくなる)

一、七才未満の幼児は服用しない
こと。

二、本剤を服用している間は、他
の五疳強心薬を服用しないこと。

🗨️相談すること

一、次の人は、服用前に医師又は
薬剤師に相談すること。

(一) 医師の治療を受けている人。

(二) 妊婦又は妊娠していると思
われる人。

(三) 本人又は家族がアレルギー
体質の人。

(四) 薬によりアレルギー症状を
おこしたことがある人。

二、五〜六日間服用しても症状が
よくならない場合は、直ちに服
用を中止し、この製品を持って、
医師又は薬剤師に相談して下さ
い。

その他の注意

(一) 定められた用法・用量を厳守
して下さい。

(二) 本剤の服用により、悪心・嘔
吐等の症状が現れる事がありま
す。この症状が特に重い場合に
は服用を中止して下さい。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (一) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (二) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (三) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (四) 一包を分割した残りを服用する場合は、袋口を折返して保管し、二日以内に服用すること。
- (五) 配置期限の過ぎた製品は、服用しないこと。

副作用被害救済制度

電話〇二二〇・一四九・九三一

【お問合せ先】

成光薬品工業株式会社相談窓口
電話〇七四五・五五・〇〇四四

成光

片仔膽



第2類医薬品