



日本薬局方 キササゲ
ナカジマ キササゲ

第2類医薬品

使用上の注意
相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人は。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
関係部位：皮膚 症状：発疹・発赤、かゆみ
3. 1ヶ月位服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
定められた用法・用量を守り正しくお使いください

効能又は効果

尿量減少。

用法及び用量

大人（15歳以上）は1日量10gを約600mLの水で約400mLになるまで煮詰め、滓をこして取り去り、食前又は食間3回に分けて服用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- ②小児の手の届かない所に保管して下さい。
- ③誤用を避け品質を保持するために、他の容器に入れ替えないで下さい。
- ④本品は防虫、防カビのため脱酸素剤を封入していますので、これを一緒に煎じないようにご注意下さい。
- ⑤ご購入の際、万一異常がありましたらお手数ですがお知らせ下さい。

製造販売元：中嶋生薬株式会社 075-231-2633

副作用被害救済制度 0120-149-931