

ご使用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

エネルギー代謝改善

エバシャインQ

Ubidecarenone(コエンザイムQ10) 製剤

■特徴

エバシャインQの主成分ユビデカレノンは、コエンザイムQ10とも呼ばれ、細胞のエネルギーのもととして心臓・腎臓・肝臓・皮膚などに存在する補酵素のひとつです。栄養素からエネルギーをつくるときに不可欠で、低下した身体の機能を高めます。特に多くのエネルギーを必要とする心臓は、ユビデカレノン(コエンザイムQ10)が不足すると働く力が低下し、血液の循環が悪くなり顔や手・足などのむくみの原因や、階段を上がっただけで息切れや動悸がするなど様々な症状が起こりやすくなります。ユビデカレノン(コエンザイムQ10)は、心臓のエネルギー不足を改善し、血液の送り出しをよくし、さらに協力的に作用するニコチン酸アミドを配合。また、天然ビタミンEが抗酸化力を高めて“錆び”を防ぎます。エバシャインQはユビデカレノンの脂溶性の性質を利用し、飲みやすく早く溶けるソフトカプセルタイプにしました。



⚠ 使用上の注意

ⓧ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください
15歳未満の小児
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品は服用しないでください
他の強心薬等

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療又は指示を受けている人。
 - (2) 心臓の病気で医師の治療又は指示を受けている人。
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 高血圧症、呼吸器の病気、腎臓の病気、甲状腺の病気、貧血などによっても、「動悸、息切れ、むくみ」等の症状が起こることがありますので、これらの持病のある人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

3. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・かゆみ
消化器	胃部不快感、食欲不振、吐き気

4. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢

5. 本剤の服用により、症状が消失した場合には、いったん服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

6. 本剤を服用して、症状が服用前より悪くなった場合(動悸やむくみが生じた場合等)は、服用を中止して、医師に相談してください

効能又は効果

軽度な心疾患により、日常生活の身体活動を少し越えた時に起こる次の症状の緩和：

動悸、息切れ、むくみ

「ただし、これらの症状について2週間ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

用法及び用量

次の量を、食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

<用法及び用量に関する注意>

(1)定められた用法及び用量を厳守してください。

成分及び分量

1日量(3カプセル)中

ユビデカレノン(コエンザイムQ10).....	30mg
ニコチン酸アミド.....	20mg
d-α-トコフェロール.....	10mg

添加物として中鎖脂肪酸トリグリセリド、サラシミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ポリソルベート80、ゼラチン、グリセリン、D-ソルビトール、パラベン、酸化チタン、黄色5号を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限内であっても一度容器のキャップを開けた後は、品質保持の点から
6ヶ月以内に使用してください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



●本品についてのお問い合わせ先

お買い求めのお店又は薬王製薬株式会社「お客様相談室」

電 話 0744-33-8855

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

薬王製薬株式会社

奈良県磯城郡田原本町245番地