

便秘薬

高血圧に伴う便秘、めまい、のぼせ、耳なり等に

複 合

生薬配合 九龍仙

本品はルチンを主薬に、生薬及びビタミンCを配合し、高血圧に伴う便秘、めまい、のぼせ、耳なり等に効果的に働くよう、処方された薬です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
4. 長期連用しないこと
5. 大量に服用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
 - (6) 次の診断を受けた人。腎臓病、甲状腺機能障害
 - (7) 体の虚弱な人。(体力の衰えている人、体の弱い人。)
 - (8) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

裏面もお読みください

〔効能・効果〕

高血圧に伴う便秘、めまい、肩のこり、のぼせ、耳なり

〔用法・用量〕

年 齢	大 人	15歳未満
1 回 量	5錠宛	服用しないこと

1日2回 白湯又は水にて服用す。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 1回5錠を服用されて強く下痢症状が現われる方は、2～3錠位から順次服用すること。
- (3) 乳、幼、小児には服用させないこと。

〔成分・分量〕

1日量（10錠中）

アスコルビン酸	10mg
ルチン	100mg
ダイオウ末	500mg
アロエ	300mg
ケイヒ末	100mg

添加物として合成ケイ酸アルミニウム、アラビアゴム末、タルク、ゼラチン、白糖末、沈降炭酸カルシウム、酸化チタンを含む。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 使用（配置）期限を過ぎたものは服用しないこと。

■お問い合わせ先

ワキ製薬株式会社 お客様相談室

住所 奈良県北葛城郡広陵町南郷898

電話 ☎0120-200-114

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元

ワキ製薬株式会社

〒635-0814 奈良県北葛城郡広陵町南郷898

URL：<http://www.a-kusuri.co.jp/>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931（フリーダイヤル）