

循環器用薬

第②類医薬品

浄血丸

浄血丸は、ルチンやアリルイソプロピルアセチル尿素、ゴオウ等を配合し、高血圧によるのぼせ・頭痛・肩こり・めまい・耳なりに効果をあらわします。



使用上の注意

**⊗ してはいけないこと**

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります〕

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがあります。)
3. 服用前後は飲酒しないでください



**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、胃部不快感、胸やけ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢、眠気
4. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**【効能・効果】**

高血圧によるのぼせ・頭痛・肩こり・めまい・耳なり

**【用法・用量】**

次の量を食後、水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人（15歳以上）	6 丸	2 回
15歳未満	服用しないでください	

**〈用法・用量に関連する注意〉**

用法・用量を厳守してください。

**【成分・分量】**

1日量（12丸）中

ア릴リソプロピルアセチル尿素 .....150mg

ゴオウ .....1mg

アロエ末\* .....200mg

ヨウバイヒ末\* .....300mg

ルチン .....60mg

チアミン塩化物塩酸塩 .....3mg

添加物として米粉、アラビアゴム、タルク、黄色4号（タートラジン）、青色1号を含有する。

**【保管及び取扱い上の注意】**


(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2)小児の手のとどかない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

（誤用の原因になったり品質が変わります。）

(4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

**■お問い合わせ先**

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお願い申し上げます。

株式会社 廣貴堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



**株式会社 廣 貴 堂**

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）