

※2015年7月改訂

この説明書は、本剤とともに
保管し、服用の際には、よくお読みください。

シュガーレス(クールレモン味)

鎮咳去痰薬 浅田飴せきどめCL

第②類医薬品

【ご使用上の注意】



してはいけないこと



[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬



相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1)医師の治療を受けている人(2)妊娠又は妊娠していると思われる人(3)授乳中の人は(4)高齢者(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(6)高熱のある人(7)心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害の診断を受けた人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	状 症
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

- 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

※【効能・効果】

せき、喘鳴(ゼーゼー、ひゅーひゅー)をともなうせき、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

【用法・用量】

次の量を口中に含み、かまざにゆっくり溶かして服用してください。服用間隔は2時間以上おいてください。

年齢	1回量	服用回数
11才以上	2錠	1日6回
5才以上11才未満	1錠	
5才未満	服用しないこと	

●定められた用法、用量を厳守してください。

●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】12錠中

dl-メチルエフェドリン塩酸塩……37.5mg クレゾールスルホン酸カリウム……135mg
セチルピリジニウム塩化物水和物……3mg

添加物として還元水アメ、還元麦芽糖水アメ、グリチルリチン酸2K、アセスルファムK、DL-リンゴ酸、レモン油、アラビアゴム、カルナウバロウ、カラメル、メントール、タルク、サラシミツロウ、シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、纖維素グリコール酸Na、香料含有

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 5才未満の乳幼児の場合には、のどにつかえるおそれがありますので服用をさけてください。(2)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にフタをしっかりとしめて保管してください。(3)小児の手の届かない所に保管してください。(4)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になります)。 (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。

製造販売元

A株式会社 浅田飴

東京都東村山市久米川町5-29-7

お問合せ先 03-3953-4044

0715M4