

※2016年6月改訂

この説明書は、本剤とともに  
保管し、服用の際には、よくお読みください。

鎮咳去痰薬 せき・たん・のどの痛みに

第②類医薬品

コフチンS

販売名:コフチンS

コフチンSは、口中でゆっくり溶かして服用することにより、せきを鎮め、たんを切り、また喘鳴をとまなうせきの緩和にも効果を発揮する、シュガーレスのドロップ剤です。

してはいけないこと



【使用上の注意】



[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

相談すること



- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)授乳中の人(4)高齢者(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(6)高熱のある人(7)心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害の診断を受けた人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

※【効能・効果】

せき、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)

をとまなうせき、たん、のどの炎症による声がれ・  
のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

【成分・分量】12錠中

dl-メチルエフェドリン塩酸塩 ..... 37.5mg  
クレゾールスルホン酸カリウム ..... 135mg  
セチルピリジニウム塩化物水和物 ..... 3mg

添加物：還元水アメ、還元麦芽糖水アメ、アセスルファムK、カンゾウエキス、アラビア  
ゴム、カルナウバロウ、L-メントール、タルク、サラシツロウ、シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸  
エステル、グリセリン脂肪酸エステル、繊維素グリコール酸Na、赤色102号、黄色5号、青色1号

【用法・用量】

右の量を口中に含み、かまずにゆっくり  
溶かして服用してください。服用間隔は  
2時間以上おいてください。

年 齢	1回量	服用回数
11才以上	2錠	1日6回
5才～10才	1錠	
5才未満	服用しないこと	

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 5才未満の乳幼児の場合には、のどにつかえるおそれがありますので服用をさけてくだ  
さい。(2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にフタをしっかりとめて保管してく  
ださい。(3) 小児の手の届かない所に保管してください。(4) 他の容器に入れ替えない  
てください(誤用の原因になったり品質が変わります)。(5) 使用期限を過ぎた製品は、  
服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用し  
てください。

発売元 **米田薬品株式会社**

大阪市浪速区塩草3丁目2-2  
お客様相談窓口 06-6562-7411

製造販売元 **A株式会社 浅田館**

東京都東村山市久米川町5-29-7

616M1