

浅田飴せきどめ SD サイダー味 24錠

第2類医薬品

鎮咳去痰薬
6錠×4スティック

△使用上の注意

⊗してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。〕本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

Ⓢ相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)授乳中の人(4)高齢者(5)薬などによりアレルギー症状を

起こしたことがある人(6)高熱のある人(7)心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害の診断を受けた人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。〔皮膚〕発疹・発赤、かゆみ〔消化器〕吐き気・嘔吐、食欲不振〔精神神経系〕めまい
3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

■用法・用量

次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。服用間隔は2時間以上おいてください。

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	3錠	1日6回
8才以上15才未満	2錠	
5才以上8才未満	1錠	
5才未満	服用しないこと	

※1度に3錠又は2錠を口中に含まず、1錠ずつなめてください。

●定められた用法、用量を厳守してください。●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■効能・効果

せき、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせき、たん、のどの炎症による声がかれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

■成分・分量

18錠中

成分		分量
d-トメチルエフェドリン塩酸塩		37.5mg
クレゾールスルホン酸カリウム		135mg
セチルピリジニウム塩化物水和物		3mg

添加物として還元水アメ、還元麦芽糖水アメ、グリチルリチン酸2K、アセスルファムK、コハク酸2Na、アラビアゴム、カルナウバロウ、D-ソルビトール、ポリソルベート80、1-メントール、タルク、サラシツロウ、シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、繊維素グリコール酸Na、青色1号、香料含有

副作用救済制度
0120-149-931

製造販売元

A株式会社 浅田飴

東京都東村山市久米川町5-29-7

●お問合せ先 お客様相談室

電話 03-3953-4044

時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

■保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。