

第②類医薬品

服用前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

鎮咳去痰薬

せきえがお



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気等があらわれることがある)
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
4. 過量服用・長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分がわるくなりくらくとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面もお読みください。)

効能

せき、たん

用法・用量

1日3回を限度とし、次の1回量を食後なるべく30分以内に服用する。

年 令	1回量
15才以上	1包
11才以上～15才未満	2/3包
8才以上～11才未満	1/2包
5才以上～8才未満	1/3包
3才以上～5才未満	1/4包

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 3才未満児には服用させないでください。

成分と作用 1包 1,000mg 中

成 分	分 量	作 用
ジヒドロコ デインリン 酸塩	10mg	せきの中枢に働いてせきをしずめます。
ノスカピン	20mg	
dℓ-メチル エフェドリン 塩酸塩	25mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
クロルフェ ニラミンマ レイン酸塩	4mg	かぜの初期にみられる鼻水、鼻づまり、くしゃみのアレルギー症状をやわらげます。
グアイフェ ネシン	100mg	たんを切ります。

添加物としてバレイショデンプン、リン酸水素Ca、ゼラチン、赤色2号を含有する。

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 1包を分割し服用した残りを使用する場合には、袋の口を折返して保管し、2日以内に服用してください。
- (4) 他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (5) 外袋に表示してある配置期限内に服用してください。

本品についての問い合わせ先

池田薬品工業株式会社 お客様相談室
電話 (076)472-3311 (大代表)
受付時間 平日 8:10～17:00

製造販売元

池田薬品工業株式会社
富山県中新川郡上市町若杉12
電話 (076)472-3311 (大代表)