



服用前に箱内側の説明を必ずお読みください。
箱はミシン目を切りはなして展開してください。

ss **BRON**
SOLUTION-L

®：登録商標

① 押して
開ける

次に、②を開けてください

せき・たんに 第2類医薬品
エスエスブロン液L
120mL

紙箱 キャップ:PP
コップ包み:PP

製造販売元
エスエス製薬株式会社
東京都新宿区西新宿3-20-2
お客様相談室 電話 0120-028-193
受付時間 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)
<https://www.ssp.co.jp/>

使用
期限

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

〔注 意〕
1.用法・用量を正しく守って服用してください。
2.次の人は服用しないください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状
を起こしたことがある人。
3.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしない
ください。
4.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販
売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こした
ことがある人。
(4)次の症状のある人。 高熱、排尿困難
(5)次の診断を受けた人。 緑内障
5.服用に際しては、箱内側の説明をよく読ん
でください。
6.直射日光の当たらない涼しい所にキャップ
をよくしめて保管してください。
7.服用後はビンの口をよく拭いてからキャップ
をしめてください。

せき・
たんに

〔効能・効果〕 せき、たん
〔用法・用量〕
次の1回量を、添付の目盛付コップではか
り、いずれも1日3回食後に服用してくださ
い。なお、場合により4時間毎に1日6回まで
服用することができます。

年 齢	成人(15才以上)	11才~14才	8才~10才
1回量	5mL	3.3mL	2.5mL

〔成 分〕 30mL中
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
.....60mg
グアイフェネシン170mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩12mg
無水カフェイン62mg
添加物：果糖ブドウ糖液糖、アルコール、ブ
ロピレングリコール、塩化Na、クエン酸、安
息香酸Na、パラベン、エチルパニリン、カラ
メル、パニリン、ℓ-メントール、香料

エスエス
ブロン液L

エスエス
ブロン液L

エスエス
ブロン液L

SS BRON SOLUTION-L

ANTITUSSIVE & EXPECTORANT

SS BRON SOLUTION-L

ANTITUSSIVE & EXPECTORANT

O

次に、③を上から切りはなしてください

② 押して
開ける

(41)



税控対象
レシート控え

第2類医薬品
SOLUTION-L
SSP CO., LTD. TOKYO JAPAN

製造販売元
エスエス製薬株式会社

B

第2類医薬品

R

第2類医薬品

SOLUTION-L
SSP CO., LTD. TOKYO JAPAN

環境保全のため説明書は
入っていません。

この箱は大切に保管し、服用前に箱の説明を
必ずお読みください。

第2類医薬品

イスエスブロン液シ

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用・事故が起こりやすくなります。)

① 次の人は服用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症
状を起こしたことがある人。

② 本剤を服用している間は、次のいずれの医 薬品も使用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒ
スタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用
内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、
催眠鎮静薬等)

③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしな いでください

(眠気等があらわれることがあります。)



相談すること

① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販 売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こし
たことがある人。
- (4) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (5) 次の診断を受けた人。 緑内障

② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作 用の可能性があるため、直ちに服用を中止 し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録 販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆ み、じんましん、声のかすれ、 くしゃみ、のどのかゆみ、息 苦しさ、動悸、意識の混濁等 があらわれる。
再生不良 性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、 発熱、皮膚や粘膜が青白く みえる、疲労感、動悸、息切 れ、気分が悪くなりくらっと する、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの 痛み等があらわれる。

③ 服用後、次の症状があらわれることがある ので、このような症状の持続又は増強が見 られた場合には、服用を中止し、この箱を 持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談 してください 口のかわき、眠気

④ 5～6回服用しても症状がよくならない場合 は服用を中止し、この箱を持って医師、薬 剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

せき、たん

用法・用量

次の1回量を、添付の目盛付
コップではかり、いずれも
1日3回食後に服用してください。なお、場合によ
り4時間毎に1日6回まで服用することができます。

年 齢	成人(15才以上)	11才～14才	8才～10才	8才未満
1回量	5mL	3.3mL	2.5mL	×服用しないこと

※目盛付コップは、使用のつどよく水洗いして、
本剤とともに清潔に保管してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督
のもとに服用させてください。

成分と作用

成 分	30mL中	作 用
デキストロメトルファン 臭化水素酸塩水和物	60mg	延髄にあるせきのコント ロール中枢に作用し、せ きの発生をおさえます。
グアイフェネシン	170mg	気道粘膜の分泌機能を たかめ、たんをうすめて 排出をうながします。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	12mg	アレルギー性のせきを しずめます。
無水カフェイン	62mg	他の成分の働きをたす けます。

添加物：果糖ブドウ糖液糖、アルコール、プロピレングリ
コール、塩化Na、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、エ
チルパニリン、カラメル、パニリン、*l*-メントール、香料

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをよ
くしめて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の
原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) キャップをしめる際、ビンの中をよく拭いてから
しめてください。ビンの口に薬液が付着したまま
キャップをしめると、まれにあげにくくなること
があります。また、しめ方が悪いと内容物が漏れ出
たり汚染することがあります。
- (5) 使用期限をすぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
イスエス製薬株式会社 お客様相談室 電話 0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

®：登録商標