

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

# 小児用エスエスブロン液エース

第②類医薬品

小児用鎮咳去痰薬 せき・たん

- せき・たんは、お子さまにとってたいへん不快で苦しいものです。特に激しいせきは、のどをいためるだけでなく、体力を消耗し、症状の回復を遅らせることがありますので、早めの治療が大切です。
- 小児用エスエスブロン液エースは、お子さまが服用しやすいシロップ剤で、苦しいせきやたんの排出にすぐれた効果をあらわします。

## ⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、鎮咳去痰薬として定められた一般的な注意事項を記載しております。

**⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- ① 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等)
- ② 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがあります。)
- ③ 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- ④ 過量服用・長期連用しないでください



### 相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4)次の症状のある人。 高熱、排尿困難  
(5)次の診断を受けた人。 緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症



- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、口のかわき、眠気
- ④ 5～6回服用しても症状がよならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

せき、たん

## 用法・用量

次の1回量を、添付の目盛付コップではかり、いずれも1日3回食後に服用してください。なお、場合により4時間毎に1日6回まで服用することができます。

年齢	11才～14才	8才～10才	5才～7才	1才～4才	3か月～11か月	3か月未満
1回量	6mL	5mL	3mL	2mL	1mL	×服用しないこと

※目盛付コップは、使用のつどよく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)12才未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。

## 成分と作用

成分	36mL中	作用
ジヒドロコデインリン酸塩	18mg	延髄にあるせきの中樞に作用し、せきの発生をおさえます。
グアイフェネシン	120mg	気道粘膜の分泌機能をたかめ、たんをうすめて排出をうながします。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	5.04mg	アレルギー性のせきをしずめます。
無水カフェイン	48mg	他の成分の働きをたすけます。

添加物：果糖ブドウ糖液糖、アルコール、グリセリン、プロピレングリコール、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、エチルバニリン、カラメル、バニリン、香料

## せき・たんの治療には…

本剤の服用のほか、次のようなことにも気をつけましょう。

- 睡眠、栄養を十分にとり体力の回復に努めましょう。
- 室内の空気の乾燥をさけましょう。
- うがいなどをしてのどをいたわりましょう。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)キャップをしめる際、ピンの口をよく拭いてからしめてください。ピンの口に薬液が付着したままキャップをしめると、まれにあけにくくなることがあります。また、しめ方が悪いと内容液が漏れ出たり汚染することがあります。
- (5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。



### お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。  
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-028-193  
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



**エスエス製薬株式会社**

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4  
<http://www.ssp.co.jp/>