

この説明文書は服用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



鎮咳去痰薬

セシオンせき止め EX 液 第②類医薬品

セシオンせき止めEX液は、ジヒドロコデインリン酸塩がせき中枢に作用し、せきを鎮めるほか、気道粘膜修復成分のL-カルボシステインをはじめ、抗炎症効果のある生薬のカンゾウエキス、去痰効果のあるキキョウ流エキスが、炎症を起こしたのどの正常化に働き、せきやたんを鎮めます。白糖を使用していないシガーレスの飲みやすいシロップ剤です。

△ 使用上の注意

- ☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
1. 次の人は服用しないこと
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)12才未満の小兒。
 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等 (鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気等があらわれることがある。)
 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
 5. 過量服用・長期連用しないこと

必ずお読みください。



▲ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
 - (3)高齢者。
 - (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5)次の症状のある人。 高熱、排尿困難
 - (6)次の診断を受けた人。 心臓病、高血圧、糖尿病、線内障、肝臓病、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーキンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘、口のかわき、眠気
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能

せき、たん

用法・用量

次の1回量を、1日3回食後に服用してください。(添付の目盛付コップではかり服用してください。)

年齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	10 mL	1日3回食後
12才~14才	6.6 mL	
12才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)本剤は生葉エキスを含有していますので、まれに沈でんを生じることがあります。効果には影響ありません。よく振ってから服用してください。

成分・分量 30mL中

成分名	分量	作用
L-カルボシステイン	750mg	粘性の高いたんを薄めるとともに、のどの粘膜を修復して、たんの排出を容易にします。
ジヒドロコデインリン酸塩	15mg	せき中枢に作用して、せきをしのぎます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	37.5mg	気管支を広げ呼吸を楽にし、たんの排出を容易にします。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	6mg	抗ヒスタミン剤。アレルギー性のせきに効果があります。
無水カフェイン	30mg	眠気を防ぎます。
カンゾウエキス	160mg (カンゾウ533.3mgに相当)	炎症を鎮め、せきやたんを緩和します。
キキョウ流エキス	0.6mL (キキョウ600mgに相当)	気道の分泌物を増加させるとともに、纖毛運動を活発にしてたんの排出を助けます。

添加物:アルコール、D-ソルビトール、スクロース、アセスルファムK、水酸化Na、クエン酸Na、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、バニリン

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。
- (4)服用後は、瓶のフタをよくしめてください。しめ方が悪いと内容液がもれたり、汚染したりすることがありますので注意してください。
- (5)添付の目盛付コップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。
- (6)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室
電話: 0120-584-419
受付時間: 10時~16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の お問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
0120-149-931(フリーダイヤル)