

この説明文書は服用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

せき止め薬


ヒストミンせき止め液NX

第2類医薬品


- ヒストミンせき止め液NXは、不快なたんの排出を助けるブロムヘキシン塩酸塩や、せきをやわらげるチペピジンクエン酸塩をはじめ、せきやたんの効果のあるバクモンドウ・車前草・キキョウの3つの生薬成分を配合したせき止め薬です。
- レモンティー風味で飲みやすい、ノンシュガータイプのシロップ剤です。

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. **次の人は服用しないこと**
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. **本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと**
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. **服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと** (眠気等があらわれることがある。)

🗨 相談すること

1. **次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
(5) 次の診断を受けた人。 緑内障
 2. **服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**
- 

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. **服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**
口のかわき、眠気
4. **5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

効 能

せき、たん

用法・用量

年齢	服用量	服用回数
成人(15才以上)	1回 10mL	1日3回食後および必要な場合には就寝前に服用してください。また、約4時間の間隔をおいていただければ1日6回まで服用できます。(添付の目盛付コップではかり服用してください。)
11才～14才	1回 6.6mL	
8才～10才	1回 5mL	
5才～7才	1回 3.3mL	
3才～4才	1回 2.5mL	
1才～2才	1回 2mL	
3ヵ月～11ヵ月	1回 1mL	
3ヵ月未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむをえない場合にのみ服用させてください。
- (4)本剤は生薬エキスを含有していますので、まれに沈澱を生じることがありますが効果には影響ありません。よく振ってから服用してください。

成分・分量

60mL中

成分名	分量	作用
ブロムヘキシシン塩酸塩	12mg	粘性の高いたんを溶解して排出しやすくします。
d-クロルフェニラミン マレイン酸塩	6mg	抗ヒスタミン剤。アレルギー性のせきに効果があります。
チペピジンクエン酸塩	60mg	せきをしずめるとともに、たんの排出を容易にします。
無水カフェイン	60mg	眠気を防ぎます。
バクモンドウ流エキス	1.2mL (バクモンドウ1200mgに相当)	炎症性のせきをしずめます。
車前草軟稠エキス	180mg (シャゼンソウ1206mgに相当)	たんの排出を助けます。
キキョウ流エキス	0.6mL (キキョウ600mgに相当)	

添加物：D-ソルビトール、スクラロース、エリスリトール、クエン酸水和物、ポビドン、安息香酸Na、パラベン、アルコール、香料、ミツロウ、L-メントール

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)服用後は、ビンのフタをよくしめてください。しめ方が悪いと内容液がもれたり、汚染したりすることがありますので注意してください。
- (5)添付の目盛付コップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。
- (6)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室
電話：0120-584-419
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の お問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元 **小林薬品工業株式会社**
岐阜県岐阜市中鷄1丁目139番地