

# せき・だんに 鎮咳去痰薬 第2類医薬品

## せきどめコデボン

【販売名】 コデボン®

効能・効果

せき・たん

用法・用量

成人（15歳以上） 1回 2カプセル

1日3回食後に服用してください。

（15歳未満は服用しないでください）

お問い合わせ先

富山めぐみ製薬株式会社 お客様相談窓口

TEL 076-421-6531

受付時間 9:00～16:30（土・日・祝日を除く）

発売元

富山めぐみ製薬株式会社

富山市三東町3-10

製造販売元

佐藤薬品工業株式会社

奈良県橿原市観音寺町3番地の2

要確認



4 987360 039450

62E14 ⑧:登録商標

成分・分量

第2類医薬品

6カプセル（成人の1日量）中  
ブトドロコデインリン酸塩.....18mg  
α-メチルエフェドリン塩酸塩.....40mg  
ノスカピン.....60mg  
グアイフェネシン.....300mg  
クロルフェニラミンマレイン酸塩.....7.5mg  
無水カフェイン.....150mg

添加物：レシチン、ステアリン酸、セルロース、カルメ  
ロースCa、ヒプロメロース、着色剤、黄色102号、  
黄色1号、ラウリル硫酸Na、亜硫酸Na、ゼラチン

注意

1. 過量服用しないでください。2. 次の人は服用し  
ないでください。15歳未満の小児。3. 服用後、薬物  
又は機械類の運転操作をしないでください。4. 授  
乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する  
場合は授乳を避けてください。5. 服用が適さない  
場合がありますので、服用前に医師、薬剤師又は  
登録販売者に相談してください。6. 服用に際しては、  
説明文書をよくお読みください。7. 直射日光の当  
たらぬ涼しい場所に保管してください。8. 小児の手の  
届かない所に保管してください。9. 使用期限を過ぎた  
製品は服用しないでください。

使用期限

製造番号

こちらをお出し下さい。



副作用被害救済制度  
0120-149-931

# せき・だんに

第2類医薬品

## せきどめコデボン

6カプセル

# せき・だんに

# せき・だんに



●とまらぬときの  
せき止めカプセル  
●飲んで効果のある  
せき止めカプセル  
せき止めカプセル

# せき・だんに

鎮咳去痰薬  
飲みやすいカプセル



C519

＊2025年8月改訂（用法・用量の変更に伴う改訂）

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮咳去痰薬の使用上の注意

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

- ＊1. 次の人は服用しないでください  
15歳未満の小児。
- 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
（眠気等があらわれることがあります。）
- 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 5. 過量服用・長期連用しないでください

👤 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難  
(6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症 状         |
|-------|-------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい         |
| 泌尿器   | 排尿困難        |

裏面もお読みください。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称   | 症 状                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症   | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。                                           |
| 呼吸抑制    | 息切れ、息苦しさ等があらわれる。                                                  |

3.服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

＊〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。