

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮咳去痰薬

第②類医薬品 桜皮抽出成分、ニンジンエキス配合
せき・たんに…

プロコデ[®]せき止め液

プロコデせき止め液の特徴

たんを切れやすくする桜皮抽出物にニンジンエキスを加え、
せき・たんの症状改善をより効果的にした液剤です。
また、本剤は小児の誤用を避けるため、小児には開けにくい
チャイルド・レジスタント包装(安全キャップ)を使用して
います。



使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
 - 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(眠気等があらわれることがあります)
 - 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
 - 過量服用・長期連用しないで下さい。
(倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります)



相談すること

- 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 高齢者
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人 高熱、排尿困難
- * (6)次の診断を受けた人 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
* 呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
便秘、口のかわき、眠気
- 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

■ 効能・効果

せき、たん

■ 用法・用量

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	10mL	3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用して下さい。 なお、場合により約4時間毎に6回まで服用できます。
11歳以上15歳未満	6.5mL	
8歳以上11歳未満	5mL	
5歳以上8歳未満	3mL	
3歳以上5歳未満	2.5mL	
1歳以上3歳未満	2mL	
3ヶ月以上1歳未満	1mL	
3ヶ月未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- * (3)12歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先して下さい。
- (4)本剤は生薬エキスが配合されているためにまれに沈でんを生じることがあります、このような場合には、よく振り混ぜて服用して下さい。

■ 成分・分量

本剤は60mL中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	はたらき
桜皮抽出物	300mg (オウヒとして 870mg)	桜皮(生薬)から抽出した植物の成分を含有しており、おだやかな作用によりたんを切れやすくします。
ニンジン軟エキス	100mg (ニンジンとして 1.1g)	せき・たんの症状改善に効果を発揮し、せきによる体力消耗を緩和します。
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきをしのぎます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきをしのぎます。
グアヤコール スルホン酸カリウム	240mg	たんを切れやすくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	10.5mg	上気道炎に伴うせきをしのぎます。
無水カフェイン	90mg	ねむけ防止作用を有します。

添加物：パラベン、リン酸二水素Na、クエン酸Na、塩化Na、白糖、香料、エチルバニリン、バニリン、アルコール、プロピレングリコール、安息香酸ベンジル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、pH調節剤、グリセリン


■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)服用のつどビンの口の周囲をよく拭いてからキャップをしめて下さい。
- (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

チャイルド・レジスタンント包装(安全キャップ)の使用法

あけ方

- 図のように
①キャップを強く
押しながら
②矢印の方向に
まわしてあけます。



しめ方

- 普通のキャップを
しめる要領で
しめます。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電話 0120-337-336

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

09登録商標



製造販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10