

せき・たん に [鎮咳去痰薬] 第②類医薬品

ペリコデ咳シロップ[®]

せきは、もともと喉や気管などの分泌物や侵入してきた異物を除去するための防衛機構です。しかしあまり過度になると、体力を消耗し、病気の回復が遅れ、さらに余病を併発する場合があります。

ペリコデ咳シロップは、鎮咳作用でせきの頻度を減らし、同時に去痰作用でたんの排泄を助けることにより、せき、たんにも効果的に作用します。この液剤はコーヒーマカ色の甘くて飲みやすいシロップ剤です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
4. 過量服用・長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、
閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症*
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
* 呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、口のかわき、眠気

4.5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

せき、たん

■ 用法・用量

1日4回、食後及び就寝前に次の量を服用してください。場合により1日6回まで服用できますが、この場合、約4時間の間隔を置いて服用してください。

年齢	1回量
15才以上	10mL
11才～15才未満	6.5mL
8才～11才未満	5mL

【用法・用量に関連する注意】

- (1)用法・用量を必ず守ってください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)薬液の分取には、添付の計量カップをご使用ください。
- (4)使用後の計量カップは水等で洗浄し清潔に保管してください。
- (5)本剤は、生薬エキスを配合していますので、わずかに混濁を生じることがありますが、薬効には影響ありません。
- (6)12才未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。



■ 成分と働き


60mL中に次の成分を含んでいます。

成分	含量	働き
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきの中枢に働いて、せきの発生を抑えます。
d1-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	せきをしずめます。
d-クオルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	アレルギー性のせきをしずめます。
グアイフェネシン	300mg	気道粘膜の分泌機能をたかめ、たんをうすめて排出をうながします。
シャゼンソウエキス (原生薬換算量1447mg)	216mg	せきをしずめ、たんをきる効果があります。
キキョウ流エキス (原生薬換算量500mg)	0.5mL	たんをきり、せきをしずめる効果があります。
ソウハクヒ流エキス (原生薬換算量600mg)	0.6mL	せきを止め、気道の炎症を抑える効果があります。
オウゴン流エキス (原生薬換算量700mg)	0.7mL	気道の炎症を抑える効果があります。

添加物として 安息香酸、クエン酸水和物、D-ソルビトール、カラメル、アルコール、香料、白糖を含んでいます。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

■ お問い合わせ先

本剤の服用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100
月～金曜日 9：00～17：00（祝祭日を除く）



製造販売元
三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-3-18