

第②類医薬品

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。

鎮咳去痰薬 とをしや鎮咳去痰剤

とをしや鎮咳去痰剤はジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩の作用により、せきをしずめ、グアイフェネシンにより、たんを切れやすいものとなりました。さらに咽喉に作用し、去痰作用のあるカンゾウ、キキョウを配合しました。

本剤は、のどにやさしく、苦しいせき、たんの改善に効果をあらわします。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
12才未満の小児。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 過量服用・長期運用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
高熱、むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 泌尿器 | 排尿困難 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 呼吸抑制 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 息切れ、息苦しさ等があらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期運用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

せき及びたん

【用法・用量】

次の量を毎食後に水又は白湯にて服用してください。

| 年 齢 | 1 回量 | 1日服用回数 |
|------------|---------|--------|
| 成人（15才以上） | 1包 | 3回 |
| 12才以上15才未満 | 2/3包 | |
| 12才未満 | 服用しないこと | |

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

3包（4.5g中）に次の成分を含有しています。

| 成 分 | 含 量 | 作 用 |
|----------------------------|---------|---------------------|
| ジヒドロコデインリン酸塩 | 30mg | せきをしずめます。 |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 75mg | 気管支をひろげ、せきをしずめます。 |
| グアイフェネシン | 300mg | たんを切れやすくします。 |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 12mg | アレルギーによるせきをしずめます。 |
| カンゾウエキス (カンゾウとして1000mg) | 200mg | 炎症をしずめます。 |
| キキョウエキス (キキョウとして500mg) | 111.1mg | のどに作用し、たんを切れやすくします。 |

添加物として、ステアリン酸Mg、乳糖水和物を含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)本剤は吸湿しやすいので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してテープ等で封をし、なるべく1日以内に服用してください。（開封状態で置いておくと顆粒が変色することがあります。変色した場合は、服用しないでください。）
- (5)本剤は生薬（薬用の草根木皮等）を原料として使用していますので、製品により色調等が異なる場合がありますが、効能・効果には変わりありません。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。
ジェーピーエス製薬 お客様相談室
 電 話 045-593-2136
 受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問い合わせ先
 （独）医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
 電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元 **ジェーピーエス製薬株式会社**
 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1