

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品



せき・たんに

セピー[®]せき止めカプセル

CEPIE COUGH CAPSULE 鎮咳去痰薬

〔特徴〕

セピーせき止めカプセルは、鎮咳作用（せきを鎮める作用）の強いジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩と去痰作用（たんを切る作用）を有するグアヤコールスルホン酸カリウムを配合した優れた鎮咳・去痰剤です。たんを伴わない乾性のせき（からせき）、たんを伴う湿性のせき、どちらに対しても優れた効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

- **1. 次の人は服用しないでください
12才未満の小児。
- 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
（眠気等があらわれることがあります。）
- 4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 5. 過量服用・長期連用しないでください

相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
（1）医師の治療を受けている人。
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（3）高齢者。
（4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
（5）次の症状のある人。高熱
- *（6）次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

*まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、眠気
- 4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

せき、たん



（必ず裏面もお読みください）

**〔用法・用量〕

年 齢	1回量	用 法
成人(15才以上)	2カプセル	1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。
12才以上15才未満	1カプセル	
12才未満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (3) (カプセル剤の取り出し方)

右図のようにカプセル剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



〔成 分〕 1日量(6カプセル)中

成 分	分量	はたらき
ジヒドロコデインリン酸塩	20mg	せきの中枢にはたらいて、せきを鎮めます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支をひろげて、せきを鎮めます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	270mg	たんを液化して、たんの切れをよくします。

添加物：カルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、結晶セルロース、無水リン酸水素カルシウム、部分アルファ化デンプン、ゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸ナトリウム

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町 10-11
受付時間 9:00～17:50(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

セビーはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11