

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ジキニン[®]液_{Da}

せきどめ薬

販売名：ジキニン液Da

第2類医薬品

ジキニン液Daは、せきを鎮め、のどにからんだたんを出しやすくする、のみやすい液剤のせきどめ薬です。

【使用上の注意】



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないでください。
12才未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがある。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
5. 過量服用・長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。高熱、むくみ、排尿困難
(6)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

〔裏面につづく〕

〔表面からのつづき〕

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

せき、たん。

【用法・用量】

次の1回量を(添付の計量カップではかり)食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	10 mL	3回
12才以上 15才未満	6 mL	
12才未満	服用しないこと	

必要な場合には1日6回まで服用できますが、このような場合には約4時間の間隔をおいてください。

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

＝安全キャップについて＝

本品には、薬量を計る計量カップ(透明)と、お子さまの誤飲を防ぐための安全キャップ(茶色)とが、透明なフィルムに包まれて添付されています。ご服用に際しては、この安全キャップをご使用ください。(この安全キャップを取付けますと、お子さまにはキャップが簡単にはけられないようになります。)

ご使用の際には、透明のフィルムをはがし、安全キャップをとり出したのち、下記手順にしたがって取付けてください。

【取付け方】

安全キャップ(茶色)を容器の白いキャップの上にかぶせ、右図のようにバチンと音がするまで手のひらで上から強く押し、取付けます。この状態では、安全キャップはから回ります。



【あけ方】

右図のように①上から強く押しながら②の矢印の方向に回し、あけてください。



【しめ方】

まず普通のキャップをしめる要領で回し、から回し始めたら、必ず上図のように①上から強く押しながら③の矢印の方向に回し、しっかりしめてください。最後に上から押さないように②の矢印の方向に回し、から回しすることを確かめてください。

◎いったん安全キャップを取付けたら、取りはずさないでください。

【成分】 (60mL中)

成分	分量	はたらき
シャゼンソウエキス	1,200 mg (原薬換算量) 8,000 mg	せき・たん効果を發揮します。
カンゾウ(甘草)エキス	200 mg (原薬換算量) 1,000 mg	炎症をやわらげ、せき・たん効果を發揮します。
ジヒドロコデインリン酸塩	30 mg	せき中枢に働き、せきを鎮めます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75 mg	気管支を広げ、せきを鎮めます。
無水カフェイン	75 mg	他の成分の働きを助けます。
クレゾールスルホン酸カリウム	270 mg	たんを切りやすくします。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6 mg	アレルギーが原因となって起こるせきに効果を發揮します。

添加物としてアルコール、安息香酸Na、エチルバニリン、クエン酸、クエン酸Na、グリセリン、炭酸水素Na、バニリン、パラベン、プロピレングリコール、香料、カルメロースNa、白糖、水アメを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)開栓後は、長期保存しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
- 2) 全薬工業お客様相談室
住所: 〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電話: 03 (3946) 3610
受付時間: 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)



製造販売元 **全薬工業株式会社**
東京都文京区大塚5-6-15