

服用に際しては、この添付文書を必ず読んでください。  
必要な時に読めるよう大切に保存してください。

鎮咳去痰薬

和漢薬エキス配合

第②類医薬品

せき・たん・ぜんそく

# ダイコー散 A

ダイコー散Aは、和漢薬のマオウ・カンゾウのエキスに、ジプロフィリン、無水カフェイン、クロルフェニラミンマレイン酸塩を配合したせき・たん・ぜんそくの治療薬です。これらの成分の働きにより、かぜや気道粘膜のアレルギー症状に伴う、せき、たんにすぐれた効果を示します。また、ぜんそく症状に対しても、気管支をひろげ、たんを切れやすくし、胸の重苦しさをとり、呼吸困難を和らげます。

## ⚠️ 【使用上の注意】



### してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)
1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
  2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気があらわれることがあります。）
  3. 過量服用しないでください。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。  
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6) 次の症状のある人。  
高熱、むくみ、排尿困難  
(7) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	動悸、排尿困難

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。  
口のかわき

## 〔成分・分量〕

茶褐色の散剤で、3包(成人1日服用量:3.6g)中、次の成分を含有します。

成 分	分 量
マオウエキス	1,880 mg
カンゾウエキス	369.6 mg
無水カフェイン	120 mg
ジプロフィリン	150 mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8.2 mg

添加物として、重質酸化マグネシウム、リン酸水素カルシウム、トモロコシデンプンを含有します。

※本剤は、和漢薬エキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

## 〔効能・効果〕

せき、たん、ぜんそく

## 〔用法・用量〕


下記1回量を1日3回食後に服用してください。

年 齢	成 人 (15才以上)	11才以上 15才未満	7才以上 11才未満	3才以上 7才未満	3才未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	服用しないこと

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返し残量を記載して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限(外箱に表示)をすぎた製品は服用しないでください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

アスゲン製薬株式会社 医薬安全情報課  
名古屋市東区泉二丁目28-8 電話:0120-935-758(フリーダイヤル)  
受付時間 午前9:00~午後5:00(土日、祝日を除く)

発売元 有限会社 大興薬局 製造販売元 **アスゲン**製薬株式会社  
大阪市都島区都島本通り3丁目15番18号 名古屋市東区泉二丁目28-8