

# せき・こえ・のど アベシデリンE

第②類医薬品

- 【保管及び取り扱い上の注意】  
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。  
(2)小児の手の届かない所に保管してください。  
(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)  
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。  
(5)ステイックパック開封後は、すみやかに服用してください。



発売元

アスデコ製薬株式会社

岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008 製造番号

製造販売元

高良市製薬株式会社

高良市高市明日香村野口10

お問い合わせ先 アスデコ製薬(株)

☎ 0572-68-1865

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 0120-149-931

## 鎮咳去痰薬

【効能・効果】  
せき、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせき、たん、のどの炎症による声がれ・のどの痛み・のどの不快感・のどの痛み・のどの痛み・のどの痛み・のど

【用法・用量】  
次の1回量を1日3~4回、口中に含み、かまますにゆっくり溶かして服用してください。

年齢	大人(15歳以上) 及び8歳以上	5歳以上 8歳未満	5歳未満
1回量	1粒ずつ2粒まで	1粒	服用しないこと

## アベシデリンE 第②類医薬品

服用に際しては、この箱の説明文書を必ず読んでください。

### ⚠ 使用上の注意

#### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠している人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人:高熱 (6) 次の診断を受けた人:心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
関係部位 発疹・発赤、かゆみ  
皮膚 吐き気・嘔吐、食欲不振  
消化器 精神神経系

3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

マオウエキス	340mg (原生葉換算量 2,040mg)	気管支をひるがせきを鎮めます。 また、のどの炎症をやわらげます。
キキョウ流エキス	400mg	気道粘液の分泌を促進し、たんを出しやすくなります。
セネガ流エキス	200mg	

添加物:黒砂糖、白糖、水アメ、グリセリン脂肪酸エステル、l-メントール、香料  
※本剤は和漢薬エキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。