

使用に際してはこの箱をよく読んでください。

鎮咳去痰薬 **ドロップコフ24粒** (4粒×6スティック)

第2類医薬品



⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

3. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気等があらわれることがあります。)

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。高熱

2. 使用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼 吸 器	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。眠気

4. 5～6回使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 せき、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

【成分・分量】 1日量(12粒)中

成 分	分 量
フェノールフタリン酸デキストロメトルファン	60mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	135mg
セチルピリジニウム塩化物水和物	6mg

添加物: 白糖、水アメ、銅クロロフィリンNa、L-メントール、ショ糖脂肪酸エステル、香料、エタノール、プロピレングリコール、バニリン

【用法・用量】 次の量を口の中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用してください。2時間以上の間隔をおいて使用してください。

年 齢	1回量	1日使用回数
大人（15才以上） 及び11才以上	2粒	5～6回
5才以上11才未満	1粒	
5才未満	使用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

BO

【お問い合わせ先】

日新薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 0120-415-688

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **日新薬品工業株式会社**

滋賀県甲賀市甲賀町田増野80-1

製 造 **高市製薬株式会社**

販売元 奈良県高市郡明日香村野口10

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)