

販売名：高砂カンゾウ

第2類医薬品

日本薬局方 **カンゾウ**



容量 500g 刻
Lot

袋の裏面も必ずお読みください。



高砂薬業株式会社
大阪市阿倍野区天王寺町南 2-1-20

—— 保管及び取扱上の注意 ——

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 - 小児の手の届かない所に保管してください。
 - 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
 - 窒素置換包装により保存性を高めてありますが、開封するとその効果は失われますので、次の点に御注意ください。
 - なるべくお早めに御使用ください。
 - 輪ゴム、クリップ等で確実に封止して保管してください。(吸湿の防止・虫や異物混入の防止)
- ◎万一製品に異常がありましたら弊社宛御連絡ください。

日本薬局方

カンゾウ

第2類医薬品

販売名：高砂カンゾウ

⚠ 使用上の注意

☒【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

🗉【相談すること】

- 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)高齢者。
 - (4)次の症状のある人。
むくみ
 - (5)次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後は、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この記載文面を持って医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は、服用を中止し、この記載文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 激しい咳、咽喉痛の緩解

【用法・用量】

年 齢	1日量	用法・用量
成人 (15歳以上)	5g	水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、滓(カス)をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。 (食間とは食後2～3時間を指します)
15歳未満	服用しないこと	

【成分・分量】 1日量 5g中 日本薬局方 カンゾウ 5g

高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南 2-1-20
お客様相談窓口 ☎ 072-977-7151 (9～17時、土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>