

この説明文書はお薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

第2類医薬品

**新せきどめ顆粒N**

鎮咳去痰薬

**使用上の注意****してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

**1. 次の人は服用しないこと**

12歳未満の小児。

**2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください**

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

**3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります。）****4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください****5. 過量服用・長期連用しないでください****相談すること****1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

(1) 医師の治療を受けている人。

(5) 次の症状のある人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

高熱、排尿困難

(3) 高齢者。

(6) 次の診断を受けた人。

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	循 環 器	動悸
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	泌 尿 器	排尿困難
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

(裏面も必ずお読みください)

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕 せき、たん

〔用法・用量〕 次の量を、毎食後あるいは食前に水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	3回
12歳以上15歳未満	2/3包	
12歳未満	服用しないでください。	

〔用法・用量に関連する注意〕

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分・分量〕 1日量（3包）中

（1包量1000mg）

成 分	分 量	作 用
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきの中枢に働いて、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支に働いてせきをしずめ、たんの排泄を助けます。
ジプロフィン	60mg	収縮した気管支を拡張し、せきをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	アレルギー性のせきをしずめます。
無水カフェイン	60mg	眠気を抑えます。

添加物：バレイショデンブ、乳糖、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース

〔保管及び取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

東亜薬品株式会社 お客様くすり相談室

〒939-3542 富山県富山市水橋開発277番10

電話：076-478-5580 受付時間：9:00～16:00（土、日、祝祭日を除く）

製造販売元

**TOA** 東亜薬品株式会社

富山県富山市水橋開発277番10