

## 第2類医薬品

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

# 南草舎利別（せき止め薬）

「せき」は、異物や分泌物を体外へ排出して、身体を守ろうとする生体にとって有益な反射運動です。しかし、せきがげしくなると体力の消耗を招いたり、安静や睡眠が妨げられたりして、病気の回復を遅らせることになります。

南草舎利別は、せきをしずめる生薬（南天実エキス）、たんを出しやすくする生薬（キキョウ流エキス、セネガエキス、ショウキョウエキス）に、せきの中枢に働いてせきをしずめるジヒドロコデインリン酸塩、気管支をひろげるdl-メチルエフェドリン塩酸塩などを配合した、服用しやすいシロップ剤です。

### 特長

- 鎮咳生薬の南天実エキス配合
- 去たん生薬を3種類配合
- せきの中枢と気管支の両方に作用
- 服用しやすいシロップ剤

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. **本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください**  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など）
2. **服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください**  
（眠気などがあらわれることがあります。）
3. **授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください**
4. **過量服用・長期連用しないでください**



#### ■ 相談すること

1. **次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください**  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難  
(6) 次の診断を受けた人。 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. **服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください**

関係部位	症 状
皮 心	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮ふや粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿などがあらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。

3. **服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください**  
便秘、口のかわき、眠気
4. **5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください**

効能・効果  
せき、たん

## 用法・用量

添付の計量カップ(目盛はmLをあらわす)に、年齢に応じて次の1回量を計り、服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	10mL	1日3回食後服用 ただし、症状に合わせて1日 6回まで服用でき、この場合 約4時間の間隔を置いて服用 してください。
11才以上15才未満	6mL	
8才以上11才未満	5mL	
5才以上8才未満	3mL	
1才以上5才未満	2mL	
1才未満	服用しないでください。	

本製品はお子様が簡単に開封出来ないように、チャイルドロック式のキャップを採用しております。

○キャップの開け方、閉め方は箱の側面に記載しています。

### <用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

### 成分・分量 1日量(60mL)中

成分	分量	はたらき
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきの中枢に働いて、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支をひろげて、せきをしずめ呼吸を楽にします。
グアヤコールスルホン酸カリウム	270mg	たんを出しやすくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン作用により、アレルギー性のせきをしずめます。
無水カフェイン	120mg	せき・たんをおさえる働きを助けます。
南天実エキス	381.6mg (原生薬換算量 2,100mg)	せきをしずめる生薬です。
キキョウ流エキス	0.9mL (原生薬換算量 900mg)	せきの原因となるたんを出しやすくする生薬です。
セネガエキス	134.4mg (原生薬換算量 900mg)	
ショウキョウエキス	87.6mg (原生薬換算量 900mg)	

添加物：液糖、pH調節剤(クエン酸)、乳酸、デキストリン、安息香酸Na、パラベン、香料(エタノール、グリセリン、バニリン、プロピレングリコール、l-メントール)

### 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)服用のつどピンの口の周囲を清潔なガーゼなどでよく拭いてからキャップをしめてください。(液が固まり、キャップが開けにくくなることがあります。)
- (6)計量カップは、使用後水洗いなどして常に清潔に保管してください。
- (7)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。

### <お問い合わせ先>

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先または下記までご連絡ください。

常盤薬品工業株式会社

お客さま相談室 ☎0120-875-710まで

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

www.tokiywayakuhin.co.jp

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎0120-149-931

### 製造販売元

常盤薬品工業株式会社

大阪市中央区安土町3-5-12

NOEVIR GROUP

CCL203