

ご使用に際して、この説明文書を必ず読んでください。
また、必要なときに読めるよう本剤とともに保存してください。

第②類医薬品 **せきにせきどめ顆粒N** 鎮咳去痰薬

せきを沈める成分と痰のねばりを取り、排出を促す成分
を配合した服用しやすい顆粒状のせきどめ薬です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)
1. 次の人は服用しないでください。 12歳未満の小児
 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乘物酔い薬、アレルギー用薬等)
 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがあります。)
 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
 5. 過量服用・長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊娠又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便祕、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能又は効果】

せき、たん

【用法及び用量】

次の量を水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	3回服用する
12歳以上15歳未満	2/3包	
12歳未満	服用しないでください	

【用法及び用量に関する注意】

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分及び分量】

1日量（3包）中

成 分	分 量
日局 ジヒドロコデインリン酸塩	30mg
ク dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg
ク クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
ク グアイフェネシン	300mg

添加物としてトウモロコシデンプン、ケイ酸A1、乳糖水和物、カルメロースCa及びヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



【お問い合わせ】

寧薬化学工業株式会社

相談窓口 ☎ 0745-22-4151

受付時間 9時～16時(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **寧薬化学工業株式会社**

奈良県大和高田市旭南町2-25