

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

鎮咳去痰薬

第2類医薬品

# ジージーコデイン液<sup>®</sup>

せきは、気道の表面にいろいろな刺激が加わることによって起こり、ただ苦しいばかりでなく、安眠を妨げて体力を消耗させ、全身を衰弱させるために、病気の治りをおくらせたり、こじらせたりします。

たんは、しばしばせきと共に発現する不快な症状で、せきをひどくしますので、せきとたんは同時に抑えるのが理想的です。

「ジージーコデイン液」は、苦しいせきをすみやかにしずめる成分と、不快なたんを排出しやすくする成分を組み合わせた、鎮咳去痰薬です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください  
12才未満の小児
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがある)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. 過量服用・長期連用しないでください



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 高齢者  
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(5) 次の症状のある人  
高熱、むくみ  
(6) 次の診断を受けた人  
心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### 効能・効果

せき、たん

#### 用法・用量

添付の目盛り付きコップで次の1回量をはかり、いずれも1日4回毎食後及び就寝前に服用してください

なお、場合により1日6回まで服用しても差し支えありませんが、この場合は服用間隔を約4時間以上おいてください

年 齢	1回量
成人（15才以上）	10mL
12才以上15才未満	6.5mL
12才未満	服用しないこと

#### <用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量を厳守してください
- 12才以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください
- 目盛り付きコップはご使用のつど、水洗いして常に清潔に保管してください

#### 成分・分量

成人1日最大量（60mL）中に次の成分を含んでいます

成 分	含 量	はたらき
グアイフェネシン	200mg	気管支の分泌液を増加させて粘性のたんをうすめ、排出しやすくします
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	延髄にあるせきの中枢に作用してせきをしずめるすぐれた作用があります
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	70mg	気管支筋の緊張をほぐし、せきをすみやかにしずめます
カンゾウエキス	400mg (原生薬として1.2g)	主成分であるサポニン、たんを排出を促し、甘味成分はのどの刺激をやわらげてせきをしずめます
セネガ流エキス	3 mL (原生薬として3.0g)	気道の分泌液を増加させ、たんが排泄しやすいようにうすめます

添加物として、パラベン、プロピレングリコール、エタノール、香料、水アメ、白糖、カラメルを含有しています

#### <成分・分量に関連する注意>

- 本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります
- 生薬成分のため濁っていますので、よく振ってから服用してください  
薬効には影響ありません

#### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
- 小児の手の届かない所に保管してください
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わる）
- 使用期限をすぎた製品は服用しないでください

#### 本製品についてのお問合せ先

- ・お買い求めのお店
- ・日邦薬品工業株式会社 学術情報室  
住 所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16  
電 話：(03)3370-7174（代表）  
受付時間：午前9：00から午後5：00まで（土、日、祝日を除く）