

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

## 鎮咳去痰薬

## 第2類医薬品

# フスコンZ液<sup>®</sup>

せきをしのぎ、たんを出しやすくするジプロフィリンやdL-メチルエフェドリン塩酸塩の他、4種類の生薬エキスを組み合わせた、お子様からお年寄りまで飲みやすいシロップ剤です。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)


- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気等があらわれることがある）

- 長期連用しないでください



## 相談すること

- 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(3) 授乳中の人の

(4) 高齢者

(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(6) 次の症状のある人

高熱、むくみ、排尿困難

(7) 次の診断を受けた人

心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

喘鳴（ぜーぜー、ひゅーひゅー）をともなうせき、せき、たん

## 用法・用量

添付の目盛りつきコップで次の量をはかり、毎食後及び就寝前に服用してください

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人（15才以上）	10mL	4回
11才以上15才未満	6.5mL	
8才以上11才未満	5mL	
5才以上8才未満	3mL	
3才以上5才未満	2.5mL	
1才以上3才未満	2mL	
3カ月以上1才未満	1mL	
3カ月未満	服用しないこと	

目盛りつきコップ



## ＜用法・用量に関する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください
- (3) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください
- (4) 目盛りつきコップはご使用のつど、水洗いして常に清潔に保管してください

## 成分・分量

成人1日量（40mL）中に次の成分を含んでいます

成 分	含 量	はたらき
オニジ流エキス (原生葉として800mg)	0.8mL	たんを出しやすくします
グアイフェネシン	200mg	せきを抑え、たんの出るのを容易にします
dL-メチルエフェドリン塩酸塩	50mg	せきを抑えます
ジプロフィリン	100mg	収縮した気管支を拡張し、せきをしづめ、たんを出しやすくします
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8mg	感冒等に伴うくしゃみ、せきを抑えます
カンゾウ流エキス (原生葉として1200mg)	1.2mL	のどの炎症を抑えて、せきが出るのを和らげます
キヨウニンエキス (原生葉として1000mg)	100mg	たんを出しやすくして、せきを抑えます
パクモンドウ流エキス	1.6mL (原生葉として1600mg)	せきを抑えます

添加物として、D-ソルビトール、パラベン、プロピレングリコール、クエン酸、クエン酸Na、香料、エタノール、グリセリン、白糖、水アメ、カラメルを含有しています

○生薬成分のため濁りを生じることがありますので、よく振ってから服用してください。薬効には影響ありません

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください

## 本製品についてのお問い合わせ先

- ・お買い求めのお店
- ・日邦薬品工業株式会社 学術情報室  
住 所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16  
電 話：(03)3370-7174 (代表)  
受付時間：午前9:00から午後5:00まで（土、日、祝日を除く）

発 売 元  日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元  日東薬品工業株式会社

京都府向日市上植野町南開35-3