

この添付文書は服用前に必ずお読みください。
また、必要時に読めるよう本剤とともに保管してください。

鎮咳去痰薬

せき・たんに

ビーレスせき止め液

第②類医薬品

せきが長く続くと睡眠はさまたげられ、食欲は減退し、体力が消耗するなど体に悪影響を及ぼし、ひいては病気に対する抵抗力も弱まってきます。

ビーレスせき止め液は、せきの中枢に作用してせきをしずめるジヒドロコデインリン酸塩と、気管支筋の緊張をゆるめてせきをおさえる dl -メチルエフェドリン塩酸塩、せきやたんの原因となるアレルギー症状をおさえるクロルフェニラミンマレイン酸塩、粘稠なたんを薄め出やすくするセネガ流エキスを配合した、飲みやすいシロップの鎮咳去痰薬です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください。
12歳未満の小児
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがあります。)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
- 過量服用・長期連用しないでください。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 高齢者
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人
高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■効能・効果

せき、たん

■用法・用量

次の量を添付の目盛りつき計量カップではかり、毎食後及び必要に応じて就寝前に服用してください。また、場合によって1日6回まで服用することができます。その場合には約4時間の間隔を置いて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上(大人)	8mL	3回 場合により約4時間の間隔を置いて6回まで可能
12歳以上15歳未満	5mL	
12歳未満	服用しないこと	

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3)服用量が少量の場合はぬるま湯で薄めて服用していただいても結構です。

■成分・分量

48mL(大人1日最大服用量)中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
セネガ流エキス	1.8mL (セネガ1,800mgに相当)	たんを切ります。
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せき中枢の異常興奮をおさえます。
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支の緊張をやわらげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	アレルギー症状をおさえます。
無水カフェイン	90mg	眠気をおさえます。

添加物として白糖、D-ソルビトール、パラベン、エタノール、カラメル、香料、グリセリン、バニリン、プロピレングリコールを含有します。

※本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼす場合があります。

■保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4)服用後はビンの口をよく拭き、フタをしっかりとめてください。しめ方が悪いと内容液が流れ出たり汚染することがあります。

(5)計量カップは、服用後よく水洗いし、本剤とともに清潔に保管してください。

(6)一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早めに服用してください。

(7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■お願い

キャップがかたいときはビンの中にお湯が入らないように注意しながらキャップ部分をお湯であたためてください。その際、お湯の温度が高すぎるとやけどしたり瓶が割れてけがをすることがありますので十分ご注意ください。

■お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。

日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電話：0748-52-1232 受付時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)

製造販売元 日野薬品工業株式会社

滋賀県蒲生郡日野町上野田119