

この添付文書は服用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管してください。

鎮咳去痰薬

せき・たんに

# メディプロHW せきどめ錠

第②類医薬品

メディプロHWせきどめ錠は、せきの中樞に作用してせきを鎮めるジヒドロコデインリン酸塩と、気管支を拡張してせきをやわらげる $d\ell$ -メチルエフェドリン塩酸塩及びたんを出しやすくする石蒜(セキサン)エキス、キキョウエキス、グアイフェネシンなどを配合していますので、せきやたんにすぐれた効果をあらわします。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください。  
12歳未満の小児
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。  
(眠気等があらわれることがあります。)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
- 過量服用・長期連用しないでください。



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 高齢者
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人 高熱、排尿困難
  - 次の診断を受けた人 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。便秘、口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ■効能・効果

せき、たん

## ■用法・用量

次の量を毎食後服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
15歳以上	3錠	3回
12歳以上15歳未満	2錠	3回
12歳未満	服用しないこと	

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)本剤の取り出し方  
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



## ■成分・分量

1日量(9錠中)に次の成分を含有しています。

成 分	分量	はたらき
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せき中枢の異常興奮をおさえます。
グアイフェネシン	270mg	たんの排出を容易にします。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支の緊張を緩和させます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	アレルギー症状をおさえます。
石蒜(セキサン)エキス-A (原生薬360mgに相当)	45mg	たんの排出を容易にします。
キキョウエキス (原生薬400mgに相当)	100mg	たんの排出を容易にします。

添加物としてD-マンニトール、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、カルメロースCa、ステアリン酸Mgを含有します。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## ■その他

本剤は、生薬抽出成分を配合していますので、製品により錠剤の色が多少異なる場合がありますが、薬効に変わりはありません。

## ■お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。

日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電話：0748-52-1232 受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

製造販売元

日野薬品工業株式会社

滋賀県蒲生郡日野町上野田119