

この添付文書は、使用前によくお読みください。  
また、使用が終わるまで大切に保管してください。

## 鎮咳去痰薬 **コフチールせきどめ錠**

第②類医薬品

コフチールせきどめ錠は「せき」の中枢に作用して「せき」をしずめる成分、気管支を拡張させて「せき」をしずめる成分、「たん」をうすめてはき出しやすくする成分などを配合していますので「せき」や「たん」にすぐれた効果を期待できます。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

##### 1. 次の人は服用しないでください

\*12歳未満の小児。

- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等  
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがあります。)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください
- 過量服用・長期連用しないでください



#### 相談すること

##### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- 医師の治療を受けている人。
- 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 高齢者。
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の症状のある人。  
高熱、むくみ、排尿困難
- 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

##### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚(ふ)	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこぼりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

##### 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、口のかわき、眠気

##### 4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

せき、たん

## 【用法・用量】

次の1回量を1日3回毎食後服用してください。


年 齢	1 回量
15歳以上	3錠
12歳以上15歳未満	2錠
12歳未満	服用しないでください

### ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



## 【成分・分量と作用】

1日量（9錠）中

成 分	分量	作 用
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支をひろげて緊張をやわらげ、せきをしずめます。
カフェイン水和物	90mg	抗ヒスタミン剤による眠気を防止します。
グアイフェネシン	150mg	気道粘液の分泌をたかめ、たんをうすめてはき出しやすくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン剤で、アレルギーが原因となって起こるせきをしずめます。
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきの中樞に作用してせきをしずめ、呼吸を楽にします。
カンゾウ末	1000mg	気道粘液の分泌をたかめ、たんをうすめてはき出しやすくします。

添加物として、乳糖水和物、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルスターチ、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸Mg、香料、l-メントールを含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

**福地製薬株式会社**

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

TEL：0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **福地製薬株式会社**  
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824