

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
又、必要な時に読めるように大切に保管してください。



## せき・たんに トコン末・カンゾウ末配合 **第2類医薬品** **セフルセキどめ錠** (鎮咳去痰薬)

せきやたんは、かぜや気管支炎などの時に起こる典型的な症状ですが、激しいせきが続くと、のどや気管支の粘膜を傷めるだけでなく、体力の消耗を招いたり、睡眠や安静がさまたげられたりして、病気自体の回復を遅らせたり、二次感染をひき起こす恐れもありますので、早めに治療することが大切です。

セフルセキどめ錠は、激しいせきをしずめるとともに、のどにからんだしつこいたんの粘りを下げてとりやすくするトコン末や、炎症を起こしているのどや気管支粘膜を保護し、たんを出しやすくするカンゾウ末などを配合し、せきやたんに優れた効果をあらわします。

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気があらわれることがあります。)
3. 本剤は、5才未満の乳幼児に服用させないでください
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください\*
5. 過量服用・長期連用しないでください\*\*



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (6) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - (7) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、ただちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください



(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

(2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
便秘、口のかわき

## 【効能】

せき、たん

【用法・用量】下記の量を服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
15才以上	4錠	3回食後
8才以上15才未満	2錠	
5才以上 8才未満	1錠	
5才未満の乳幼児	服用しないでください。	

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。




## 【成分・分量】

成 分	分量(1日量(12錠)中)	作 用
トコン末	10mg	気道分泌を促進して、からんだたんをうすめて、出しやすくします。
カンゾウ末	500mg	炎症を起こしているのどや気管支粘膜を保護し、たんを出しやすくします。
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	中枢神経に作用し、その鎮咳作用により、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	末梢神経に作用し、気管支をひろげ、はげしいせきをしずめ、のどを楽にします。
ノスカピン	60mg	非麻薬性のせきどめ薬で、せきの中枢に働いてせきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	270mg	のどの粘膜からまるたんをうすめて、出しやすくします。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	アレルギー性のせきに効果を示します。
無水カフェイン	150mg	眠気を防止します。

\*添加物として乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、二酸化ケイ素を含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。  
ホーユー株式会社 お客様相談室  
電話：(052)935-9941 受付時間：土・日・祝日及び弊社休業日を除く午前9時～午後5時

発売元 **hoyu** ホーユー株式会社  
名古屋市東区徳川一丁目501

製造販売元 **国産薬品工業株式会社**  
岐阜市秋沢370番2