

この説明書は本剤とともに保管し、服用に際しては必ずお読みください。

鎮咳去痰薬

第②類医薬品

ぜんそく、せき、たん

せきどめモリユートンS

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の状況が悪化したり、
副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬・乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
（眠気等があらわれることがある）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	め ま い
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	泌 尿 器	排 尿 困 難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 口のかわき、眠気
- 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果 ぜんそく、せき、たん

用法・用量 次の量を1日3回、毎食後に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回	5才以上8才未満	1/3包	3回
11才以上15才未満	2/3包		3才以上5才未満	1/4包	
8才以上11才未満	1/2包		3才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量 1日量3包(4800mg)中

成 分	3包中
マオウエキス(原生薬マオウ 3000mg相当)	500mg
カンゾウ末	300mg
バクモンドウエキス(原生薬バクモンドウ 1275mg相当)	750mg
オウゴン末	600mg
ショウキョウ末	300mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	9mg
無水カフェイン	120mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	270mg
ゴオウ	3mg

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、リン酸水素カルシウム水和物、軽質無水ケイ酸、L-メントール、バレイシヨデンブンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 湿気などにより薬が変質することがあるので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

お問い合わせ先

森本製薬株式会社 お客様相談室
 受付時間: 10時から17時まで(土、日、祝日を除く)
 電 話: 0745-62-2225

製造販売元 **森本製薬株式会社**
 奈良県御所市783番地