

キリアカタマ



登 録

商 標

第②類医薬品

鎮咳去痰薬

新 **セキドメ**

・ 奈良株式会社赤玉堂 榎原 ・

第②類医薬品

新セキドメ

効能・効果 せき、たん

用法・用量

15才以上（成人） 1回……1包 1日3回食後服用する。

- * (1) 用法及び用量を厳守すること。
(2) 15才未満の小児には、服用させないこと。

成分・分量 1日量3包(1包1.1g)中

ジヒドロコデインリン酸塩…………… 30mg dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩… 75mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩… 12mg グアイフェネシン…………… 300mg
添加物としてケイヒ末、カンゾウ末、パレイシヨデンブン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

- (注) 1. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
3. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと
5. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
6. 配置期限経過後は服用しないこと

奈良県橿原市曲川町2丁目7-13
製造販売元 株式会社 赤玉堂
TEL 0744-22-0269

2包(1.1g×2)入
¥250.+税



A

この使用上の注意は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

鎮咳去痰薬

第②類医薬品

⚠ 新セキドメ使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起りやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと 15歳未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気等があらわれることがある。)
4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
5. 過量服用・長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人 高熱、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

裏面もお読みください

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 配置期限経過後は服用しないこと。