

この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

生薬配合 後藤散 **せきどめ**

第②類医薬品

咳中枢を抑えるノスカピンと去痰作用のある甘草末が辛い咳を早くしずめます。
飲みやすいサラサラ顆粒タイプの咳止め薬で、のどをスーッとさせる爽やかな後味です。

使用上の注意

 **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります。)

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
(7) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

(裏面につづく)

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(口の渇き、眠気)

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能 せき、^{ぜんめい}喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせき*、たん

用法・用量 下記の1回量を、1日3回食後に服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	15歳以上	11～14歳	8～10歳	5～7歳	3～4歳	3歳未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分と作用 1包(1.3g)中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量	作 用
カンゾウ(甘草)末	300mg	咳をしずめ、痰を出しやすくします。抗炎症作用があります。味は甘く、薬の服用をスムーズにします。
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	25mg	気管支をひろげ、のどを楽にして、激しい咳をしずめます。
ノスカピン	20mg	咳の中枢に作用して咳をしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	4mg	くしゃみなど、アレルギー性の咳に効果があります。
無水カフェイン	50mg	眠気を緩和する作用があります。

上記の有効成分のほかに、顆粒の有用性を高める目的で、以下の成分が配合されています。

ℓ-メントール、精製白糖、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

(5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

(6)顆粒がフィルムの内側に付着する場合がありますが、品質には問題ありません。付着した場合は、軽く叩いてお出してください。

 **うすき製薬株式会社**
大分県臼杵市市浜997-1

お客様相談室(月～金 8:00～17:00)
 0120-5103-81(ゴトーサン、ハイ!)
ホームページ www.gotosan.co.jp

副作用被害救済制度の問合せ先 (独)医薬品医療機器総合機構  0120-149-931