

日本薬局方 **カンゾウ**

## 【使用上の注意】

## してはいけないこと

(守らないと、現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

## 短期間の服用にとどめ、連用しないこと

## 相談すること

1. 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)高齢者
- (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5)次の症状のある人      むくみ
- (6)次の診断を受けた人      高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症 ミオバチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 【効能・効果】

激しい咳、咽頭痛の緩解

## 【用法・用量】

年 齢	1日量
大人 (15歳以上)	本品 5gを、水約600mLをもって煮て、約400mLに煮つめ、滓をこして取り去り食前または食間3回に分服する。
15歳未満	服用しないで下さい

## 【成分・分量】

1日量(5g)中

日本薬局方 カンゾウ 5g

## 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり品質が変わる)

※混煎剤は腐敗を防ぐため冷所に保存して下さい。

副作用被害救済制度 電話0120-149-931

## お客さま相談窓口

本製品内容についてのお問合わせは、下記にお願い申し上げます。  
電話:(076)431-7017 FAX:(076)431-7013  
受付時間:午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 (株)延寿堂

〒930-0813 富山市下赤江町1-13-3