

第2類医薬品

日本薬局方
カンゾウ末

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保存してください。

 使用上の注意


[してはいけないこと]

(守らないと、現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

短期間の服用にとどめ、連用しないこと



[相談すること]

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

用法・用量

次の量を食前または食間に服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	0.5g	2回
15才未満	服用しないで下さい	

※添付さじ 1杯 0.5g

効能・効果

激しいせき、咽喉痛の緩解

成分・分量

1日量(1.0g)中 日本薬局方 カンゾウ末 1.0g

保管および取扱上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

その他の注意

- 本品は生薬の粉末ですので、製品により粉末の色調が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

お客様相談窓口

本製品内容についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

製造販売元：株式会社 延寿堂(えんじゅどう)

〒930-0813 富山県富山市下赤江町1-13-3

電話：076-431-7017 FAX：076-431-7013

受付時間：午前9:00から午後4:30まで(土、日、祝日を除く)