

## 第②類医薬品

せき・たん

ご使用前に、この添付文書を必ずお読み下さい。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

# フストールシロップS

甘草(カンゾウ)エキス配合

フストールシロップSは「せき」をしずめ「たん」の切れをよくします。

また、甘くて飲みやすいシロップ剤ですから、お子様からお年寄りまでの服用に適しています。

フストールシロップSは「たん」のからむ「湿性のせき」にも有効ですが、特に過剰な「空せき」に効力を発揮します。

睡眠時「せき」が出て眠れない、「せき」により体力が消耗する等、どうしても止めたい過剰な「せき」にはジヒドロコデインリン酸塩(咳中枢を抑制する中枢性鎮咳剤)及びカンゾウエキス(抗炎症、抗アレルギー作用を有する鎮咳・去痰剤)を配合したフストールシロップSが有効です。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気等があらわれることがあります。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
4. 過量服用・長期連用しないでください。



### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 高齢者  
(4) 薬などにより、アレルギー症状を起こしたことがある人  
(5) 次の症状のある人  
高熱、むくみ、排尿困難
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
便秘、口のかわき、眠気
4. 5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 〔成分・分量〕

成分名	分量(60mL中)	作用
カンゾウエキス (原生薬換算量)	300mg 1.17g)	抗炎症作用のある生薬エキスで、気道分泌を促進し、たんをはき出しやすくします。
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	咳中枢に働いて、せきをしずめます。
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を広げ、せきをしずめてのどを楽にします。
グアヤコールスルホン酸カリウム	270mg	気道分泌を促進して、たんをうすめてはき出しやすくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン剤で、アレルギー性のせきに効果を発揮します。
無水カフェイン	120mg	眠気を防ぎます。

添加物として、クエン酸Na、D-ソルビトール、白糖、パラベン、安息香酸Na、エタノール、プロピレングリコール、香料を含有しています。

## 〔効能・効果〕

せき、たん

## 〔用法・用量〕

下記の1回量を添付の目盛付計量コップにとり、1日4回毎食後及び就寝前に服用してください。  
なお、場合によっては、約4時間の間隔を置いて1日6回まで服用しても差し支えありません。

年齢	1回量
成人(15才以上)	10mL
11才以上～15才未満	6.6mL
8才以上～11才未満	5mL
5才以上～8才未満	3.3mL
3才以上～5才未満	2.5mL
1才以上～3才未満	2mL
3カ月以上～1才未満	1mL

添付の目盛付計量コップをご利用ください。

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させてください。
- (4) 本剤は生薬エキスを含有しておりますので、まれに沈澱を生じることがありますが効果には影響ありません。よく振ってから服用してください。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 目盛付計量コップは使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。
- (5) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

### 本品に関するお問い合わせ

オール薬品工業株式会社 くすり相談室  
〒661-0953 兵庫県 尼崎市東園田町2丁目106番地  
TEL(06) 6491-6222  
電話受付時間：月～金(祝・祭日を除く)  
9:00～17:00