

せき・たん… **ドリグッドせきどめ液**

ドリグッドせきどめ液は、「せき」をしずめ「たん」の切れをよくします。

また、甘くて飲みやすいシロップ剤ですから、お子様からお年寄りまでの服用に適しています。

ドリグッドせきどめ液は、「せき」をしずめるジヒドロコデインリン酸塩や「たん」を出しやすくするブロムヘキシン塩酸塩などを配合したシロップ剤です。

ドリグッドせきどめ液は、白糖を使用していないシュガーレスのシロップ剤です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
5. 過量服用・長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人
高熱、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しき、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯茎の出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔成分・分量〕

成分名	分量 (60mL中)	作用
ブロムヘキシン塩酸塩	12mg	気管支粘膜での分泌物を増加させ異物の排出をスムーズにします。さらに、分泌腺から分泌される粘性の高いたんを溶解して排出しやすくします。
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	咳中枢に働いてせきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を拡張、せきをしずめてのどを楽にします。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	抗ヒスタミン剤。アレルギー性のせきに効果があります。
無水カフェイン	60mg	眠気を防ぎます。
キキョウ流エキス	0.6mL (キキョウ600mgに相当)	気道の分泌物を増加させるとともに、繊毛運動を活発にしてたんを排出を助けます。
セネガ流エキス	0.6mL (セネガ600mgに相当)	

添加物として、D-ソルビトール、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料を含有しています。

〔効能・効果〕

せき、たん

〔用法・用量〕

下記の1回量を添付の計量コップにとり、1日3回食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。また、約4時間の間隔をあければ、1日6回まで服用できます。

年 令	1回量
成人 (15歳以上)	10mL
11歳以上～15歳未満	6mL
8歳以上～11歳未満	5mL
5歳以上～8歳未満	3mL
3歳以上～5歳未満	2.5mL
1歳以上～3歳未満	2mL
1歳未満	服用しないでください

- (1) 定められた用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 2歳未満の乳幼児には、医師の治療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させてください。
- (4) 本剤は生薬エキスを配合しておりますので、まれに沈殿を生じることがありますが、効果には影響はありません。よく振ってから服用してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 服用後は、ビンのフタをよくしめてください。しめ方が悪いと内容液がもれたり、汚染したりすることがありますので注意してください。
- (5) 添付の計量コップは使用のつど、水洗などして常に清潔に保管してください。
- (6) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

本品に関するお問い合わせ

オール薬品工業株式会社 くすり相談室
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地
TEL (06) 6491-6222
電話受付時間：月～金 (祝・祭日を除く)
9:00～17:00

製造販売元 **オール薬品工業株式会社**
兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地

