

この説明書は、お薬とともに保管し、ご使用の際には、よくお読みください。

鎮咳去痰薬

せきとたんにすぐれた効き目の

**コデリン S**

第 2 類医薬品

本剤に配合された成分が、“せき”をしずめ、“たん”のきれをよくします。



使用上の注意



**してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

**1. 次の人は服用しないでください**

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 今までに本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

**2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください**

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔いアレルギー用薬)、鎮静薬

**3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気があらわれることがあります。)**

**4. 過量服用・長期連用しないでください**

(倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります。)

**5. 授乳中の人は本剤を使用(服用)しないが、本剤を使用(服用)する場合は授乳を避けてください**



**相談すること**

**1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状がある人。

高熱、排尿困難

(7) 次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧症、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

**2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください**

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

(2) 5~6 回服用しても症状がよくなる場合

**3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください**

便秘、口のかわき

[ 効 能 ]

せき、たん

### 【用法・用量】

下記の量を食後に水又はお湯と一緒に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1包	3回
11才以上15才未満	2 / 3包	
8才以上11才未満	1 / 2包	
5才以上8才未満	1 / 3包	
5才未満	服用しないでください。	

#### <用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### 【成分と働き】

3包（1日量）中に次の成分を含んでいます。

成分	分量	働き
ジヒドロコデインリン酸塩散 1%	3000mg	せき中枢に作用してせきを鎮めます。
d l - メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を拡張し呼吸を楽にします。
ノスカピン	60mg	せき中枢に作用してせきを鎮めます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	アレルギー症状を抑えます。
グアイフェネシン	300mg	痰を切れやすくします。

添加物として乳糖、アラビアゴム末を含む。



### 【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光のあたらない涼しいところに保管してください。
- (2)小児の手の届かないところに保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

### お問い合わせ先

森田製薬株式会社 消費者相談窓口  
電話：0954-62-2331  
受付時間：午前8時30分から午後5時まで（土、日、祝日は除く）

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

発売元  森田製薬株式会社  
佐賀県鹿島市大字三河内甲 960 番地  
製造販売元  カシマ薬品商事株式会社  
佐賀県鹿島市古枝字天神甲 470 番地 12