

制定年月 平成24年10月

ご使用に際し、この添付文書は必ずお読みください。また、必要な時にお読みになれるように大切に保管してください。

トコン末、カンゾウ末配合
せき、たん

ジスコールせきどめ錠S

第②類医薬品

せきやたんは、かぜや気管支炎などの時に起こる典型的な症状ですが、激しいせきが続くと、のどや気管支の粘膜を痛めるだけでなく、体力の消耗を招いたり、睡眠や安静が妨げられたりして、病気自体の回復を遅らせたり、二次感染を引き起こす恐れもありますので、早めに治療することが大切です。

ジスコールせきどめ錠Sは、激しいせきをしずめるとともに、のどにからんだしつこいたんの粘りを下げてとりやすくするトコン末や、炎症を起こしているのどや気管支粘膜を保護し、たんを出しやすくするカンゾウ末などを配合し、せきやたん



してはいけないこと



『使用上の注意』

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 5歳未満の小児

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがあります。)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

5. 過量服用・長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- 医師の治療を受けている人。
- 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 高齢者。
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の症状がある人。

高熱、排尿困難

- 次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧症、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

裏面もお読みください

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能又は効果】

かせせき・たん

【用法及び用量】

1日3回食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	4錠	3回
8才以上15才未満	2錠	
5才以上8才未満	1錠	
5才未満の乳幼児	服用しないでください	

「用法及び用量に関する注意」

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2) 用法・用量を厳守してください。

【成分及び分量】 1日量 (12錠) 中

成 分	配合量	主な作用
トコン末	10mg	気道分泌を促進して、からんだたんをうすめて、出しやすくします。
カンゾウ末	500mg	炎症を起こしているのどや気管支粘膜を保護し、たんを出しやすくします。
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	中枢神経に作用し、その鎮咳作用により、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	末梢神経に作用し、気管支をひろげ、激しいせきをしずめ、のどを楽にします。
ノスカピン	60mg	非麻薬性のせきどめ薬で、せきの中枢に働いてせきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	270mg	のどの粘膜にからまるたんをうすめて、出しやすくします。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	アレルギー性のせきに効果を示します。
無水カフェイン	150mg	眠気を防止します。

添加物としてセルロース、二酸化ケイ素、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。


【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光のあたらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないで下さい。

お問い合わせ先

カシマ薬品商事株式会社 消費者相談窓口
電話 0120-117-938
受付時間 午前9時～午後5時
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元  カシマ薬品商事株式会社
佐賀県鹿島市古枝字天神甲470-12