

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

ゼーゼー、ヒューヒューするせき、たんに

新カネドリン錠

第2類医薬品
鎮咳去痰薬

〔 ⚠ 使用上のご注意 〕

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。(眠気等があらわれることがあります)



相談すること

1. 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合には副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
□ のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

(⇒裏面に続きます)

効能・効果

せき、喘鳴（ぜーぜー、ひゅーひゅー）をともなうせき、たん

用法・用量

年齢区分	1回量
15才以上	2錠
8～14才	1錠

左記1回量を1日3回食後服用して下さい。
服用間隔は4時間以上おいて下さい。

- お子さまに服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 用法及び用量をお守り下さい。
- 8才未満のお子さまには服用させないで下さい。

成分・分量

本品1日量（6錠）中

成分	分量	作用
トリメトキノール塩酸塩水和物	6mg	せきに効果があります。
マレイン酸カルピノキサミン	9mg	アレルギー性のせきを改善します。

添加物として、セルロース、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、タルクを含有します。

保管・取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）
- (4)右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）
- (5)使用期限の過ぎた製品は服用しないで下さい。



消費者ご相談窓口

本剤をご使用になり、何かお気づきの点がございましたら下記発売元までご連絡いただきます様お願い申し上げます。

発売元 **ノイジ** 薬品株式会社 大阪府松原市高見の里4丁目8番16号

お客様相談室：072-331-0417

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **株式会社 廣昌堂** 富山県射水市水戸田2841