

効能・効果 せき、たん

用法・用量 大人15歳以上…1回1包 12歳以上15歳未満…1回2/3包

1日3回、毎食後に服用してください。

【用法及び用量に関連する注意】(1)用法及び用量を厳守すること。(2)小児(12歳以上15歳未満)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量 1日量(3包)中

ジヒドロコデインリン酸塩……………30mg

クアモニウムブromide……………270mg

クアモニウムブromide……………1000mg

トロキソプロピルセルロースを含有する。

△使用上の注意 **⊗してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと、12歳未満の小児。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、折入タミロン

剤を含有する内服薬等(肺炎用内服薬、異物除去薬、アシル

ギ一用薬等) 3. 服用後、食物又は機械類の運搬操作をし

ないこと。(服薬等があらわれることがある。) 4. 授乳中の

人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避

けること。 5. 過量服用、長期連用しないこと。

※相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は

登録販売者に相談すること。(1)

医師の治療を受けている人。(2)妊娠又は妊娠していると思

われる人。(3)高齢者。(4)薬などによりアレルギー一症状

を起こしたことのある人。(5)次の症状のある人。高熱

(6)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、中状

腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性肥厚性無呼吸症候群、

肥満症 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

呼吸抑制 息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このよ

うな症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中

止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相

談すること。便秘、眠気 4. 5～6回服用しても症状が

よくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医

師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない

涼風の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手

が届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替え

ないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)

2包(1包1050mg×2)入 希望小売価格 ¥250+税

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用期限 製造番号

紙

第②類医薬品

せき、たん



新セキドムS

ジヒドロコデインリン酸塩主剤

製造販売元 御所薬舗株式会社
奈良県御所市1207

お客様相談窓口 電話 0745-62-3388

TRADE MARK

