



服用前に箱内側の説明を必ずお読みください。箱はミシン目を切りはなしで展開してください。

NEW BRON SOLUTION -ACE

®：登録商標

① 押して開ける

次に、②を開けてください

せき・たん に 第②類医薬品

新ブロン液エース

120mL

紙箱 キャップ：PP
コップ包み：PP
外装フィルム：PE、PP

製造販売元
エスエス製薬株式会社
東京都新宿区西新宿3-20-2
お客様相談室 電話 0120-028-193
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)
<https://www.ssp.co.jp/>

使用期限

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

- 〔注意〕1.過量服用・長期連用しないでください。
2.用法・用量を正しく守って服用してください。
3.次の人は服用しないでください。12才未満の小児。
4.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
5.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
6.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4)次の症状のある人。高熱、排尿困難
(5)次の診断を受けた人。緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
7.服用に際しては、箱内側の説明をよく読んでください。
8.直射日光の当たらない涼しい所にキャップをよくしめて保管してください。
9.服用後はビンの中をよく拭いてからキャップをしめてください。

新ブロン液 エース

せき・たん に

新ブロン液 エース

〔効能・効果〕 せき、たん
〔用法・用量〕
次の1回量を、添付の目盛付コップではかり、いずれも1日3回食後に服用してください。なお、場合により1日6回まで服用しても差支えありませんが、この場合は服用間隔を4時間以上おいてください。

年齢	成人(15才以上)	12才~14才
1回量	10mL	6.6mL

〔成分〕 60mL中
ジヒドロコデインリン酸塩 ……30mg
グアイフェネシン ……170mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 ……12mg
無水カフェイン ……62mg

添加物：果糖ブドウ糖液糖、アルコール、プロピレングリコール、塩化Na、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、エチルパニリン、カラメル、パニリン、ℓ-メントール、香料

新ブロン液 エース

NEW BRON SOLUTION -ACE

ANTITUSSIVE & EXPECTORANT

NEW BRON SOLUTION -ACE

ANTITUSSIVE & EXPECTORANT

O

次に、③を上から切りはなししてください

② 押して開ける

④1



税控対象
レセプト対応

第②類医薬品

SSP CO., LTD. TOKYO JAPAN

第②類医薬品

製造販売元
エスエス製薬株式会社

第②類医薬品

SSP CO., LTD. TOKYO JAPAN

環境保全のため説明書は
入っていません。

この箱は大切に保管し、服用前に箱の説明を
必ずお読みください。

第②類医薬品

新ブロン液エース

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用・事故が起こりやすくなります。)

① 次の人は服用しないでください

12才未満の小児。

② 本剤を服用している間は、次のいずれの医 薬品も服用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒ
スタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用
内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、
催眠鎮静薬等)

③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしな いください

(眠気等があらわれることがあります。)

④ 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を 服用する場合は授乳を避けてください

⑤ 過量服用・長期連用しないでください (倦怠感や虚脱感等があらわれることが あります。)



相談すること

① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販 売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こし
たことがある人。
- (4) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (5) 次の診断を受けた人。 緑内障、呼吸
機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、
肥満症

② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作 用の可能性があるため、直ちに服用を中止 し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録 販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良 性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、 発熱、皮膚や粘膜が青白くみえ る、疲労感、動悸、息切れ、気分 が悪くなりくらっとする、血尿等 があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛 み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

③ 服用後、次の症状があらわれることがある ので、このような症状の持続又は増強が見 られた場合には、服用を中止し、この箱を 持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談 してください 便秘、口のかわき、眠気

④ 5～6回服用しても症状がよくならない場合 は服用を中止し、この箱を持って医師、薬 剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

せき、たん

用法・用量

次の1回量を、添付の目盛
付コップではかり、いずれ
も1日3回食後に服用してください。なお、場合に
より1日6回まで服用しても差支えありませんが、
この場合は服用間隔を4時間以上おいてください。

年 齢	成人(15才以上)	12才～14才	12才未満
1回量	10mL	6.6mL	×服用しないこと

※目盛付コップは、使用のつどよく水洗いして、
本剤とともに清潔に保管してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督
のもとに服用させてください。

成分と作用

成 分	60mL中	作 用
ジヒドロコデイン リン酸塩	30mg	延髄にあるせきの中樞 に作用し、せきの発生 を抑えます。
グアイフェネシン	170mg	気道粘膜の分泌機能を たかめ、たんをうすめて 排出をうながします。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	12mg	アレルギー性のせきを しずめます。
無水カフェイン	62mg	他の成分の働きをたす けます。

添加物：果糖ブドウ糖液糖、アルコール、プロピレングリ
コール、塩化Na、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、エ
チルパニリン、カラメル、パニリン、ℓ-メントール、香料

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをよ
くしめて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の
原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) キャップをしめる際、ピンの口をよく拭いてから
しめてください。ピンの口に薬液が付着したま
まキャップをしめると、まれにあげにくくなるこ
とがあります。また、しめ方が悪いと内容液が漏
れ出たり汚染することがあります。
- (5) 使用期限をすぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 電話 0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

®：登録商標