

ご使用に際し、この添付文書は必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

2013年1月：記載要領変更に伴う改訂

第②類医薬品

鎮咳去痰薬 セキドメ



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気等があらわれることがある。)

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人は。
(4) 高齢者。
(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
(7) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、腎内障、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
アナフィラキシー様症状	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

口のかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

せき、たん

【用法・用量】

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に水またはお湯と一緒に服用すること。

年齢区分	服用量(1回量)
15歳以上	1包
11歳以上15歳未満	2/3包
8歳以上11歳未満	1/2包
5歳以上8歳未満	1/3包
3歳以上5歳未満	1/4包
3歳未満	服用しないこと

(用法・用量に関連する注意)

- 定められた用法、用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 3才未満の幼・乳児には服用させないこと。

【成分・分量・はたらき】

1日量 3包(3,000mg)中

成 分	分 量	は た ら き
チペビジンヒベンズ酸塩	75mg	せきをしすめ、たんを排出しやすくなります。
dl-メチルエフェドリン 塩酸塩	75mg	気管支を拡げ、せき、たんを抑えます。
ノスカピン	60mg	せきの中核に作用してせきをしすめます。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	10mg	せきやたんの原因となるアレルギー症状をおさえます。
無水カフェイン	100mg	痛みをしすめるはたらきを助けます。

添加物：乳糖水和物、カルメロースナトリウム、カルメロースカルシウム

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- 使用期限（外箱記載）を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先

製造販売元 西海製薬株式会社

住 所 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦192番地
電話番号 0942-92-2303(代)
受付時間 9:00～16:00(土、日、祝日を除く)