

第2類医薬品

鎮咳去痰薬

コバドリンA錠a

KOBADRIN A Tab.a

セキは気管に入った異物や老廃物を、タンとして体外に排出する作用を助けますが、セキはジェット機にたとえられるほど呼気が激しいので、エネルギーをひどく消耗し、ただでさえ衰弱している患者の体力を一層衰えさせます。また就寝時のセキは不眠の原因となります。

従って、セキを伴う諸種の病気の治療に際しては、まず適切な鎮咳・去痰薬の服用がたいせつです。

コバドリンA錠aは、苦しい咳を鎮め、タンを切るのに必要な薬剤を適正量配合した淡黄色の錠剤です。

⚠ 使用上の注意

🚫 してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。

12歳未満の小児

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等

(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気等があらわれることがあります)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

5. 過量服用・長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(3) 高齢者

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(5) 次の症状のある人

高熱、排尿困難

(6) 次の診断を受けた人

心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 泌尿器 | 排尿困難 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-------|------------------|
| 呼吸抑制 | 息切れ、息苦しさ等があらわれる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、口のかわき、眠気
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

せき、たん

【用法・用量】

下記の量を食後水又はお湯と一緒に服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|------------|---------|--------|
| 大人(15歳以上) | 2錠 | 3回 |
| 12歳以上15歳未満 | 1錠 | 3回 |
| 12歳未満 | 服用しないこと | |

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思ひぬ事故につながります。)



(PTPシート取り出し図)

【成分と働き】

6錠中に次の成分を含んでいます。

| 成 分 | 6錠中 | 作 用 |
|-----------------|-------|------------------------|
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 75mg | 気管支筋のけいれんをおさえ、せきをしめます。 |
| ジヒドロコデインリン酸塩 | 21mg | せきをおさえます。 |
| グアイフェネシン | 300mg | たんを排出しやすくします。 |
| ジフェンヒドラミンサリチル酸塩 | 81mg | アレルギー症状をおさえます。 |
| 無水カフェイン | 150mg | 他の成分の働きを助けます。 |
| カンゾウ末 | 300mg | 鎮咳、去痰作用があります。 |

添加物としてケイ酸AI・ヒドロキシプロピル starch・セルロース、ステアリン酸Mgを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 使用期限(外装に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

この製品をご使用になられて、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

新新薬品工業株式会社 お客様相談室

富山県富山市今市324番地

電話番号 076-435-0878

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



製造販売元 新新薬品工業株式会社

富山県富山市今市324番地