



TRADE MARK

セキ薬

ジヒドロコデイン 主剤  
メチルエフェドリン

エフニン

"Ephunin"

第②類医薬品

SEIKO YAKUHIN KOGYO

牛黄配合

せきどめ



## 効能・効果

せき、たん

## 用法・用量

15歳以上 ..... 1回 1包  
12歳以上15歳未満 ..... 1回  $\frac{2}{3}$ 包

1日3回食後に服用する。

注意) (1)用法・用量を厳守すること。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成分・分量 3包(3g)中

ゴオウ(牛黄) ..... 3.0mg  
キキョウ末(桔梗) ..... 900mg  
ジヒドロコデインリン酸塩 ..... 30mg  
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 ..... 75mg  
クロルフェニラミンマレイン酸塩 ..... 12mg  
無水カフェイン ..... 150mg  
添加物：カンゾウ末、リン酸水素Ca、ケイ酸Al、バレイショ  
デンプン、デヒドロ酢酸Na

## 注意

1. 12歳未満の小児は服用しないこと
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
4. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと
6. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
7. 配置期限の過ぎた製品は服用しないこと

1g×2包入

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

¥300 + 税



外装



分包

配置期限



成光薬品工業株式会社

奈良県北葛城郡広陵町大塚739  
相談窓口 0745-55-0044

服用に際して、この文書を必ずお読みください。  
又、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

# セキ薬 エフニン

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 12歳未満の小児は服用しないこと
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと  
(眠気等があらわれることがある。)
4. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
5. 過量服用・長期連用しないこと



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人。 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

裏面もお読みください

- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 便秘、口のかわき、眠気
- 4.5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。  
 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。(5) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。



**成光薬品工業株式会社**

〒635-0834 奈良県北葛城郡広陵町大塚739  
 TEL 0745-55-0044 FAX 0745-55-5265